

Información sobre procedimientos generales

Por favor, lea estas instrucciones dos semanas antes

-Haga arreglos para que un conductor venga con usted y permanezca en nuestra sala de espera durante su prueba.

Método de preparación laxante

* Siga estas instrucciones. **NO siga las**

instrucciones en la caja

SUPREP – Dosis dividida

Suministros para comprar

1. Kit SUPREP (receta de relleno)
2. Bebidas productos líquidos claros

Instrucciones generales

2 semanas antes del procedimiento

-Dejar de tomar productos herbarios

1 semana antes del procedimiento

-Dejar de tomar aspirina, AINE y sangre

Diluyentes **3, 4 o 5** días o como

aprobado por su médico prescriptor.

Usted puede tomar Tylenol (paracetamol)

-Dejar de tomar multivitamínicos, vitamina E, hierro,

suplementos de aceite de pescado, frutos secos y semillas.

Días antes de su procedimiento

-Comprar suministros

-Leer a través de estas direcciones

-Si su procedimiento es en summit

Centro de Endoscopia, espera llamada de departamento de anestesia para discutir su historia clínica.

Si usted es diabético, lea y siga las instrucciones diabéticas especiales.

¿Preguntas? Por favor, vea primero las preguntas más frecuentes. Si aún tiene preguntas, llame al 770-719-3240.

Día antes del procedimiento

Fecha: _____

INSTRUCCIONES DE DIETA

Solo puede tener LÍQUIDOS CLAROS todo el día antes de su procedimiento

NO SE deben comer ALIMENTOS SÓLIDOS en este día

Ejemplos de LÍQUIDOS CLAROS: jugos de frutas tensas (manzana, uva blanca, arándano blanco).

Limeada, limonada, café, té (sin crema), Coca-Cola, Pepsi, Refresco de dieta, no rojas refrescos, caldo de pollo o carne de res, postres de gelatina sin fruta añadida o cobertura batida

EVITE líquidos ROJOS y PÚRPURAS, incluido el tinte alimentario

EVITAR LA LECHE y las bebidas alcohólicas

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

-A las 5 PM, Vierta una botella de 6 onzas de líquido SUPREP en el recipiente de mezcla.

Agregue agua potable fría a la línea de 16 onzas del recipiente.

-Beba TODO el líquido del recipiente durante un período de 30 minutos.

-Siga inmediatamente con 32 onzas de líquidos transparentes durante la próxima hora.

-Continúe bebiendo líquidos transparentes hasta la hora de acostarse.

Día del Procedimiento

Fecha _____

Es posible que no tenga tabaco sin humo (inmersión, masticar, etc.) o marihuana en este día.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

-6 horas ANTES DE PARTIR para el procedimiento

-Vierta una botella de 6 onzas de líquido SUPREP en el recipiente de mezcla. Agregue agua potable fría a la línea de 16 onzas en el recipiente.

-Beba TODO el líquido del recipiente durante un período de 30 minutos.

-Siga inmediatamente con 32 onzas de líquidos transparentes durante la próxima hora.

- **No ponga nada más en la boca** excepto un pequeño sorbo de agua con el corazón, la presión arterial o los medicamentos para convulsiones.

- **Usted debe tener NADA en la boca 4 horas antes de su procedimiento.** (Esto significa QUE NO hay agua, virutas de hielo, goma de mascar, caramelos, gotas para la tos, etc.)

**Cualquier contenido en el estómago podría

subir, entrar en los pulmones mientras bajo anestesia.

INSTRUCCIONES GENERALES

-Puede cepillarse los dientes y gárgaras antes de su examen.

-NO use LOCIÓN CORPORAL O JOYERÍA CORPORAL.

Por favor, retire todos los piercings (lengua, mejilla, nariz, etc.) antes de la llegada.

-Debe tener un conductor que permanezca en el campus del hospital mientras se realiza el procedimiento.

-No seguir estas instrucciones puede hacer que su procedimiento se retrase o cancele.