

## Información sobre procedimientos generales

### **Por favor, lea estas instrucciones dos semanas antes**

-Haga arreglos para que un conductor venga con usted y permanezca en nuestra sala de espera durante su prueba.

### Método de preparación laxante

\* Siga estas instrucciones. **NO siga las instrucciones de la caja.**

### **NO hay dieta baja en residuos.**

### **SUTAB – Dosis dividida**

Suministros para comprar

1. Kit SUTAB (receta de relleno)
2. Bebidas productos líquidos claros

### Instrucciones generales

2 semanas antes del procedimiento

-Dejar de tomar productos herbarios

1 semana antes del procedimiento

-Dejar de tomar aspirina, AINE y sangre

Diluyentes **3, 4 o 5** días o como

aprobado por su médico prescriptor.

Usted puede tomar Tylenol (paracetamol)

-Dejar de tomar multivitamínicos, vitamina E, hierro,

suplementos de aceite de pescado, frutos secos y semillas.

Días antes de su procedimiento

-Comprar suministros

-Leer a través de estas direcciones

-Si su procedimiento es en summit

Centro de Endoscopia, espera llamada de

departamento de anestesia para discutir su historia clínica.

Si usted es diabético, lea y siga las instrucciones diabéticas especiales.

¿Preguntas? Por favor, vea primero las preguntas más frecuentes. Si aún tiene preguntas, llame al 770-719-3240.

## Día antes del procedimiento

Fecha \_\_\_\_\_

### INSTRUCCIONES DE DIETA

Solo puede tener LÍQUIDOS CLAROS todo el día antes de su procedimiento

**NO SE** deben comer ALIMENTOS SÓLIDOS en este día.

Ejemplos de LÍQUIDOS CLAROS: jugos de frutas tentas (manzana, uva blanca, arándano blanco). Limeada, limonada, café, té (sin crema), Coca-Cola, Pepsi, Refresco de dieta, refrescos no rojos, caldo de pollo o carne de res, postres de gelatina sin fruta añadida o cobertura batida

EVITE líquidos ROJOS y PÚRPURAS, incluido el tinte alimentario

EVITAR LA LECHE y las bebidas alcohólicas

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

#### **DOSIS 1:**

-**Paso 1:** A **las 5 PM**, comience la dosis 1. Abra 1 frasco de 12 comprimidos. Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada comprimido con un sorbo de agua y beba toda la cantidad de agua durante 15 minutos.

- **Paso 2:** 1 hora después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda la cantidad durante 30 minutos.

-**Paso 3:** Espere 30 minutos y luego llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado), y beba la cantidad total durante 30 minutos.



-Continúe bebiendo líquidos transparentes hasta la hora de acostarse.

## Día del Procedimiento

Fecha \_\_\_\_\_

Es posible que no tenga tabaco sin humo (inmersión, masticar, etc.) o marihuana en este día.

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

#### **DOSIS 2:**

- **6 horas ANTES DE PARTIR para el procedimiento**

Comenzar la dosis 2: Repita **los pasos del 1 al 3** de la dosis 1.

- Debe completar todos los comprimidos de SUTAB y el agua requerida al menos 4 horas antes de la colonoscopia.



- **No ponga nada más en la boca** excepto un pequeño sorbo de agua con el corazón, la presión arterial o los medicamentos para convulsiones.

- **Usted debe tener NADA en la boca 4 horas antes de su procedimiento.** (Esto significa QUE NO hay agua, virutas de hielo, goma de mascar, caramelos, gotas para la tos, etc.)

\*\*Cualquier contenido en el estómago podría

subir, entrar en los pulmones mientras bajo anestesia.

### INSTRUCCIONES GENERALES

-Puede cepillarse los dientes y gárgaras antes de su examen.

-NO use LOCIÓN CORPORAL O JOYERÍA CORPORAL.

Por favor, retire todos los piercings (lengua, mejilla, anillos de nariz, etc.) antes de la llegada.

-Debe tener un conductor que permanezca en el campus del hospital mientras se realiza el procedimiento.

-No seguir estas instrucciones puede hacer que su procedimiento se retrase o cancele.