



**CLARENCE**  
FARM SERVICES LIMITED

Téléphone: 1-800-565-4314  
Fax: 1-902-893-1652  
[www.clarencefarmservices.com](http://www.clarencefarmservices.com)

# INFIRMIÈRE CHOW 20-20


Réf. 1153

## Lait d'allaitement pour veaux de remplacement

**NURSE CHOW 20-20** est un lait Purina à haute teneur énergétique Substitut spécialement formulé pour l'alimentation hivernale et en particulier pour l'alimentation des veaux en clapier. La protéine est composée de protéines de lait et d'un isolat de soja de haute qualité qui contient une combinaison optimale de protéines hautement digestibles et de glucides à base de lait.



FONCTIONNALITÉS	AVANTAGES
Formulation spéciale : Combinaison optimale de protéines Sources 20 % de protéines brutes 20% de matière grasse Équilibré en vitamines et minéraux	Le lait d'allaitement riche en matières grasses et en énergie augmente le gain de poids des veaux et améliore l'économie des veaux Permet une transition rapide vers le veau Fastart Startena tout en répondant aux besoins nutritionnels du veau préruminant Favorise une croissance optimale et un développement maximal du cadre puisque les veaux reçoivent le bon équilibre de nutriments
Économique	Un sac de 20 kg remplace 1,6 hectolitre de lait de vache pour une bonne croissance à un coût plus modéré
Mixage flash	Gain de temps : un mélange facile signifie moins de temps lors de la préparation du lait d'allaitement
Séjours en suspension	Les veaux reçoivent un mélange uniforme assurant un apport nutritionnel constant et équilibré
Fabriqué dans une usine approuvée HACCP avec des normes élevées de biosécurité et de qualité	Alimentation de qualité constante Démontrer notre engagement envers la salubrité des aliments et la satisfaction de nos clients
Aliment Purina fabriqué au Canada	Minimise les coûts de transport Optimise la fraîcheur



**CLARENCE**  
FARM SERVICES LIMITED

# INFIRMIÈRE CHOW 20-20 Code 1153

Donnez Purina Nurse Chow 20-20 selon ce qui suit :

## Mode d'emploi :

Mesurez la quantité appropriée de **poudre Nurse Chow 20-20** dans une tasse fournie par votre revendeur Purina et ajoutez-la à de l'eau chaude (110 °F/43 °C). Mélangez bien, ajoutez de l'eau fraîche pour amener la solution à la température du corps du veau (102 °F/38,5 °C).

Nourrissez immédiatement selon les instructions ci-dessous :



Âge	Poudre(g) /alimentation*	litres ou solution totale/alimentation* *	Tétées/Jour **
1-3 jours	Colostrum	2	2
4-7 jours	250	2	2
2-4 semaines	250	2	2
Semaine 5 jusqu'au sevrage**	250	2	1-2



## ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes	Min.	20.00%
Protéines provenant de sources laitières	Min.	10.00%
Matières grasses brutes	Min.	20.00%
Fibres brutes	Max.	0.30%
Calcium	Réel	1.00%
Phosphore	Réel	0.80%
Sodium	Réel	0.80%
Vitamine A	Min.	50 000 UI/kg
Vitamine D <sub>3</sub>	Min.	8 000 UI/kg
Vitamine e	Min.	35 UI/kg

(>35 kg à la naissance). Pour les animaux de petite race (<35 à la naissance en kg), réduire les quantités à environ 80 % du total.

\*\*Pendant les périodes de stress dû au froid, le nombre de tétées par jour peut augmenter, la quantité de lait d'allaitement donnée par tétée peut également être augmentée. Des taux de croissance plus élevés peuvent être obtenus en suivant ces recommandations à tout moment. Ne pas dépasser la concentration de 15 % (150 g de poudre/1 litre d'eau). Pour assurer un bon développement du rumen avant le sevrage, la consommation de lait de remplacement doit être encouragée en diminuant la quantité de lait de remplacement donnée après l'âge de 4 semaines.


Fournissez un démarreur de veau Purina à volonté au début du jour 3. Lorsque le veau consomme 750 g de lait de démarrage pendant 3 jours consécutifs, le sevrage peut commencer. Les veaux devraient recevoir 2 à 4 litres de colostrum dans les 20 premières minutes de leur vie.

## OPTIMISEZ LA RATION DE VOS VEAUX

Clarence Farm Services Ltd. vous recommande de suivre les pratiques de gestion suivantes :

1. Fournir une source d'eau propre et fraîche en tout temps.
2. Assurez-vous que les ustensiles d'alimentation des veaux sont nettoyés après chaque utilisation.
3. Fournir au veau un environnement sec, bien litière et à l'abri des courants d'air pour réduire les problèmes de maladie.
4. Tout changement de ration doit être effectué progressivement.
5. Consultez votre vétérinaire pour connaître le programme de santé du troupeau recommandé. Ces recommandations ont pour but de servir de guide. Ils doivent être ajustés aux variables de la direction, de l'environnement et des besoins individuels. Si nécessaire, consultez votre concessionnaire Purina ou votre conseiller agricole de Clarence Farm Services Ltd.

Sacs de 20 kg



**CLARENCE**  
FARM SERVICES LIMITED