



Lorsque vous recevez vos poussins : Les poussins de faisan peuvent être élevés de la même manière que les poulets, à quelques exceptions près. Ne placez pas les faisans sur une surface lisse. Nous suggérons que pendant la première semaine, vous élevez les poussins sur une surface grillagée, de préférence avec une taille de maille de 1/4 » x 1/4 ». Cela permettra aux poussins de se déplacer en toute sécurité sans se coincer les pattes, et leur fournira également un environnement propre. Si le fil est soutenu par un cadre en bois de 2 » x 4 », les excréments passeront à travers et les poussins ne pourront manger que la nourriture que vous leur fournissez. Une autre alternative consiste à élever les poussins sur une surface rugueuse telle qu'un morceau de toile de jute propre ou une vieille serviette propre. Cette surface rugueuse fournira une assise sûre et empêchera le « spraddle leg ».

Les poussins doivent avoir de l'eau toujours à leur disposition. Nous recommandons des fontaines à poussins d'un gallon, disponibles dans votre magasin d'alimentation. Nous recommandons également d'ajouter un booster de vitamines à l'eau dans la quantité prescrite pour la première semaine de vie, ce qui peut être fait facilement à l'aide d'un abreuvoir de type fontaine.

La nourriture doit être disponible en tout temps. Un crumble de dinde fin ou une ration de pré-démarrage (médicamenteuse) fonctionne bien pendant les 6 premières semaines de la vie.

La chaleur doit être fournie par des lampes chauffantes infrarouges suspendues au-dessus de la tête, à moins de 18 pouces du sol. Les ampoules blanches sont trop brillantes et ont tendance à provoquer un cannibalisme précoce. Prenez un thermomètre et placez-le au niveau du poussin. Vous pouvez commencer les poussins à 95 ° F (35 ° C) pendant la première semaine. Après la première semaine, baissez la température de 5 ° F (2-3 ° C) par semaine jusqu'à ce qu'ils aient 4 à 5 semaines et puissent être laissés à l'extérieur.

Les poussins de faisan sont relativement faciles à élever. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de chaleur pour se réchauffer, s'éclairer, se nourrir et s'abreuver dans un environnement propre et exempt de courants d'air (les jeunes faisans ne supportent pas les courants d'air). Fournissez ces choses et vous devriez avoir du succès.

Lorsque vos poussins ont 1 semaine : Retirez le booster de vitamines de l'eau de boisson. Vous pouvez déplacer les poussins hors de la grille métallique et sur le sol. Nous suggérons des copeaux de pin frais ou de la paille pour la litière à cet âge. Les poussins peuvent rester sur une litière propre jusqu'à ce qu'ils puissent sortir. Si possible, réduisez les niveaux de lumière pour éviter le cannibalisme (cueillette). Cela peut être fait en utilisant un gradateur de lumière ordinaire sur une ampoule. Réduisez progressivement le niveau de lumière au fur et à mesure que les oiseaux vieillissent. Une fois que les oiseaux savent où se trouvent la nourriture, l'eau et la chaleur, ils n'ont pas besoin de lumière vive. N'oubliez pas qu'ils ont encore besoin de chaleur. Une autre façon d'éviter la cueillette est de donner plus d'espace aux oiseaux.

Lorsque les oiseaux ont 4 semaines : À cet âge, les oiseaux peuvent être autorisés à quitter votre grange, mais gardez-les dans un enclos, sinon ils s'envoleront. Une protection supplémentaire peut être nécessaire les nuits froides et orageuses. Les faisans imperméabilisent progressivement leurs plumes après avoir été exposés à la première averse printanière. Une fois les plumes imperméabilisées, vous serez sur la bonne voie pour des oiseaux sans problème. La cueillette peut se produire à nouveau à ce stade, mais elle peut généralement être contrôlée en donnant plus d'espace aux oiseaux ou en coupant le bec. Fournir des branches de cèdre sous lesquelles les oiseaux peuvent se cacher aidera également.

de nourriture et d'eau. Les faisans adorent la végétation verte. Si vous pouvez leur fournir des enclos herbeux ou herbeux, ils prospéreront et cela devrait vous faire économiser de l'argent sur l'alimentation ! Changez le régime alimentaire pour la finition de dinde (non médicamenteuse) à l'âge de 14 semaines. Les oiseaux atteindront leur poids de marché (3 lb pour les coqs, 2 lb pour les poules) vers 18 semaines. La cueillette pendant cette phase peut être contrôlée à l'aide de spécifications de faisan, ou encore une fois en donnant plus d'espace ou en taillant le bec des oiseaux.