



AGRORAISE®

REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO I.
PROMOTOR DE DESARROLLO RADICULAR. POLVO SOLUBLE.

Información del producto:

AgroRaise® es un Regulador de crecimiento tipo 1, con acción de enraizador y fertilizante de alto desempeño. Está especializado en la estimulación de la planta para la generación y mantenimiento de raíces, tanto primarias (raíz de anclaje) como secundarias (pelos absorbentes), además del desarrollo de tallos y ramas fuertes.

AgroRaise® posee una fórmula balanceada de nutrientes (N, P, Zn, Fe, Ca y Si) que fortalecen y nutren a la planta, más fitohormonas enraizadoras tipo auxinas que promueven la generación del sistema radicular y mejoran la tasa de absorción de nutrientes, contiene agentes quelatantes y ácido fúlvico que permiten una absorción óptima de los componentes de la formulación.

Beneficios:

- Estimulación para generación de raíces de anclaje.
- Estimulación para generación de pelos absorbentes.
- Máxima asimilación en suelos ácidos, neutros o alcalinos, gracias a su formulación con ácidos fúlvicos.
- Nutrición de Alto Rendimiento, que fortalece y nutre a la planta para que genere raíces de forma natural.
- Mejora el grosor de los tallos.
- Fortalece a la planta para resistir el ataque de nemátodos, bacterias y hongos entopatógenos de la raíz.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% EN PESO
Nitrógeno (N)	8.63
Fósforo (P ₂ O ₅)	51.70
Ácido Indolbutírico	0.02
Ácido Naftalenacético	0.28
Fierro (Fe)	0.35
Zinc (Zn)	0.20
Calcio (Ca)	0.08
Silicio (SiO ₂)	6.03
L-a-Aminoácidos	1.00
Ácido Fúlvico	2.03
Acondicionadores	29.68

Características:

Auxinas
BIOACTIVAS

 **APLICACIÓN EN
DESARROLLO
VEGETATIVO**

**BIO
SILEX**
TECNOLOGÍA

 **APLICACIÓN
VIA DRENCH
FERTIRRIEGO**

 **DESARROLLO
RADICULAR**

Aplicación:

AgroRaise® puede ser aplicado vía sistema de riego o en drench, en agricultura protegida o a cielo abierto, en hidroponía o en cultivo tradicional.

CULTIVO	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
Banano	1 – 2 Kg/Ha	Aplicar cada 3 meses después del deshije.
Aguacate	1 – 2 Kg/Ha	Aplicar en brotación y desarrollo vegetativo.
Ajo y Cebolla	1 – 2 Kg/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y bulbificación.
Arándano, Frambuesa, Zarzamora, Fresas	1 – 2 Kg/Ha	En vivero, aplicar 1g/pta cada 8 días. En trasplante, desarrollo radicular, desarrollo vegetativo aplicar la dosis recomendada.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor	1 – 2 Kg/Ha	En plántulas, aplique 0.5g/L de agua, cada 8 días. Aplique la dosis recomendada en trasplante y desarrollo vegetativo.
Calabaza, Pepino, Melón, Sandía	1 – 2 Kg/Ha	En plántulas, aplique 0.5g/L de agua, cada 8 días. Aplique la dosis recomendada en trasplante y desarrollo vegetativo.
Espárragos	1 – 2 Kg/Ha	Aplicar a la corona en estimulación para brotación y en desarrollo de turiones.
Naranja, Limón, Toronja	1 – 2 Kg/Ha	En vivero, aplicar 1g/pta cada 8 días. Aplique en trasplante, desarrollo y producción.
Papaya	1 – 2 Kg/Ha	En plántulas, aplique 0.5g/L de agua, cada 8 días. Aplique la dosis recomendada en trasplante y desarrollo vegetativo.
Piña	1 – 2 Kg/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo, estimulación de floración y desarrollo de fruto.
Tomate, Chile, Pimiento, Berenjena	0.5 – 1 Kg/Ha	En plántulas, aplique 0.5g/L de agua, cada 8 días. Aplique la dosis recomendada en trasplante y desarrollo vegetativo.
Papa, Zanahoria	1 – 2 Kg/Ha	Aplicar en la siembra, desarrollo vegetativo y tuberización.

INCOMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los insumos agrícolas. Incompatible con productos, mezclas y derivados de sustancias altamente ácidas o altamente alcalinas. Si se desconoce la compatibilidad con algún producto en específico, realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla final.

FITOTOXICIDAD: AgroRaise® no es fitotóxico a los cultivos y en las dosis recomendadas en esta etiqueta.



AGRONOMEX

AGROINSUMOS NUTRIENTES Y SERVICIOS DE MÉXICO SA DE CV, garantiza el contenido indicado en la composición porcentual de la etiqueta. Sin embargo, el fabricante no se hace responsable por los resultados que se obtengan del producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos. Tampoco se hace responsable del incumplimiento de las instrucciones mencionadas en esta etiqueta, toda vez que la dosificación, manejo y aplicación del producto son circunstancias que están fuera del control del mismo.