

CYTOSTIM®

REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO I, CON
CALCIO (Ca) Y CITOCININAS.
LÍQUIDO CONCENTRADO.

Información del producto:

CYTOSTIM® es un Regulador de Crecimiento a base de citocininas bioactivas, Calcio (Ca), Nitrógeno (N), Algas Marinas y Ácido Fúlvico. Promueve la división y fortalecimiento celular, regula la dominancia apical y activa la formación de brotes laterales, yemas florales y tejido nuevo en general. Gracias a la acción de formación activa de tejido nuevo, retrasa el envejecimiento prematuro de los órganos de la planta.

CYTOSTIM® se aplica en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas, vía aspersión foliar al cultivo. Puede ser aplicado en agricultura protegida o a cielo abierto.

Beneficios:

- Activación del crecimiento y desarrollo de brotes laterales.
- Formación de tejidos nuevos gracias a su efecto de promoción de la división celular.
- Promueve la floración.
- Mejora el amarre.
- Evita deficiencias de Calcio en fruto.
- Prolonga la vida útil de la planta.
- Evita el envejecimiento prematuro.
- Prolonga la vida post-corte de flores.
- Prolonga la vida de anaquel de frutos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA % EN PESO

Nitrógeno Total (N)	5.50
Calcio (Ca)	10.00
Citocininas	0.03
Algas marinas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	5.00
Ácido Fúlvico	5.50
Agentes Quelatantes	3.30
Acondicionadores y diluyentes	70.67
TOTAL	100.00

Características:

6 BAP
Citocininas
Bioactivas

 **INCREMENTA**
LA FORMACIÓN DE
YEMAS FLORALES

 **DIVISIÓN Y**
FORTALECIMIENTO
CELULAR

 **APLICACIÓN**
VÍA FOLIAR

 **APLICACIÓN EN**
DESARROLLO
VEGETATIVO
Y FLORACIÓN

Aplicación:

CYTOSTIM® se aplica vía foliar, en agricultura protegida o a cielo abierto, en hidroponía o en cultivo tradicional.

CULTIVO	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
Aguacate	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y floración. Repetir cada 20 días.
Ajos y Cebolla	1 – 2 L/Ha	Aplicar en etapa de 5 a 6 hojas y repetir de 12 a 15 días.
Arándano, Frambuesa, Zarzamora, Fresas	1 – 2 L/Ha	Aplicar en floración y desarrollo de fruto.
Banano	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo de bellota y fruto.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y en la formación de la cabeza (inflorescencia).
Calabaza, Pepino, Melón, Sandía	1 – 2 L/Ha	Aplicar en prefloración, floración y desarrollo inicial de fruto.
Espárragos	1 - 2 L/Ha	Aplicaciones para brotación y desarrollo de turión.
Frijol, Ejote, Garbanzo, Chícharos, Haba	0.5 – 1 L/Ha	Aplicar en prefloración, floración y desarrollo de vainas.
Naranja, Limón, Toronja	1 – 2 L/Ha	Aplicar en prefloración, floración y llenado de frutos.
Papaya	1 – 2 L/Ha	Aplicar en prefloración, floración y llenado de frutos.
Piña	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo, floración y maduración de fruta.
Tomate, Chile, Pimiento, Berenjena	1 – 2 L/Ha	Aplicar en prefloración, floración y desarrollo inicial de fruto.
Papa, Zanahoria	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y tuberización

INCOMPATIBILIDAD: CYTOSTIM® es compatible con la mayoría de los insumos agrícolas. Si se desconoce la compatibilidad con algún producto en específico, realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla final.

FITOTOXICIDAD: CYTOSTIM® no es fitotóxico a los cultivos y en las dosis recomendadas en esta etiqueta.



AGRONOMEX

AGROINSUMOS NUTRIENTES Y SERVICIOS DE MÉXICO SA DE CV,
garantiza el contenido indicado en la composición porcentual de la etiqueta. Sin embargo, el fabricante no se hace responsable por los resultados que se obtengan del producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos. Tampoco se hace responsable del incumplimiento de las instrucciones mencionadas en esta etiqueta, toda vez que la dosificación, manejo y aplicación del producto son circunstancias que están fuera del control del mismo.