



AGROBOTANIC[®] LARREA^{LC}

EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE GOBERNADORA
(*Larrea tridentata*) BIOFUNGICIDA Y BIOBACTERICIDA
BOTÁNICO APTO PARA AGRICULTURA ORÁGANICA
LÍQUIDO CONCENTRADO.

Información del producto:

AGROBOTANIC[®] LARREA LC es un fungicida y bactericida botánico a base de extracto hidroalcohólico de gobernadora (*Larrea tridentata*), elaborado a partir de hojas de la planta. Sus componentes naturales (ácidos orgánicos y resinas) tienen un amplio espectro contra bacterias y hongos fitopatógenos. Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento micelial de hongos fitopatógenos. Contiene Ácido Nordihidrohuayarético (NDHA). Producto no residual.

Beneficios:

- Control efectivo de enfermedades foliares y de suelo en cultivos agrícolas.
- Modo de acción por contacto y sistémico.
- Práctica aplicación vía foliar y vía riego.
- Sin intervalo de seguridad entre la aplicación y la cosecha, es decir: Cero días a cosecha.
- Producto botánico de origen orgánico.

Composición:

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO

Extracto de gobernadora (<i>Larrea tridentata</i>)	100.00
TOTAL	100.00

Certificación Orgánica:



Aplicación:

AGROBOTANIC[®] LARREA LC puede ser aplicado vía foliar o sistema de riego, en drench, en agricultura protegida o cielo abierto, en hidroponia o en cultivo tradicional.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIÓN
Aguacate (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	5 - 10 mL/L de agua.	Realizar aplicaciones en aspersión foliar a intervalos de 6 - 7 días.
Ajo y Cebolla (SL)	Mancha bacteriana (<i>Pseudomonas viridiflava</i>)	5 - 10 mL/L de agua.	Realizar aplicaciones en aspersión foliar a intervalos de 6 - 7 días.
Arándano, Fresa, Frambuesa, Zarzamora (SL)	Pudrición Gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Mildiu (<i>Peronospora rubi</i>)	5 - 10 mL/L de agua.	Realizar aplicaciones en aspersión foliar a intervalos de 8 - 10 días.
Banano (SL)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	2 - 3 L/Ha	Realizar aplicaciones en aspersión foliar a intervalos de 14 días. Inicie las aplicaciones previo a los primeros síntomas.
Cafeto (SL)	Roya del Cafeto (<i>Hemileia vastatrix</i>)	1 - 3 L/Ha	Realizar aplicaciones en aspersión foliar a intervalos de 7 días.
Calabaza, pepino, melón, sandía (SL)	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	5 - 10 mL/L de agua.	Realizar aplicaciones en aspersión foliar al detectar los primeros síntomas.
Papaya (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	5 - 10 mL/L de agua.	Realizar aplicaciones en aspersión foliar al detectar los primeros síntomas.
Tomate, jitomate, chile, pimiento, berenjena (SL)	Fusariosis (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1 - 4 L/Ha	Realizar aplicaciones vía suelo previo a la aparición de los primeros síntomas.

Intervalo de Seguridad: SL: Sin Límite.

Periodo de Reentrada: En cuanto la aplicación seque en la superficie de las hojas del cultivo.

INCOMPATIBILIDAD: Solo deberá mezclarse con productos de la misma naturaleza (orgánica) registrados en los cultivos autorizados, pero se sugiere realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: **AGROBOTANIC® LARREA LC** no es fitotóxico a los cultivos y en las dosis recomendadas en esta etiqueta.



AGRONOMEX

AGROINSUMOS NUTRIENTES Y SERVICIOS DE MÉXICO SA DE CV.,

garantiza el contenido indicado en la composición porcentual de la etiqueta. Sin embargo, el fabricante no se hace responsable por los resultados que se obtengan del producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos. Tampoco se hace responsable del incumplimiento de las instrucciones mencionadas en esta etiqueta, toda vez que la dosificación, manejo y aplicación del producto son circunstancias que están fuera del control del mismo.