

Cálculo I

Licenciatura

Semana 08 - Aula 2

Derivada Implícita,
Logarítmica e Exponencial

Prof. Henrique Antonio Mendonça Faria

henrique.faria@unesp.br

Derivadas

- Para encerrar os conceitos iniciais sobre as derivadas abordaremos na aula de hoje:
 - ✓ Derivada implícita;
 - ✓ Teorema de L'Hopital.

Derivação implícita

The background is a dark green board filled with faint, white mathematical formulas and diagrams. A prominent diagram in the center shows a sphere with several intersecting great circles, resembling a celestial globe or a complex geometric construction. Other formulas include trigonometric identities like $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ and various algebraic expressions.

Derivada implícita

- A equação $y = f(x)$, em que a variável y aparece sozinha é definida explicitamente;
- Algumas vezes, a variável dependente y não aparece sozinha e não pode ser isolada;

Derivada implícita

- A equação $y = f(x)$, em que a variável y aparece sozinha é definida explicitamente;
- Algumas vezes, a variável dependente y não aparece sozinha e não pode ser isolada;
- **Por exemplo:** $yx + y + 1 = x$
- Mesmo assim é possível derivar a função, operação denominada derivação implícita.

Definição 4.1.1

“Dizemos que uma equação em x e y define a função implicitamente se o gráfico de $y = f(x)$, coincidir com alguma porção do gráfico da equação.”

Exemplo 1

O gráfico da equação $x = y^2$ não é uma função $y = f(x)$, pois não passa no teste da reta vertical. Contudo, pode ser resolvida para y .

Exemplo 1

O gráfico da equação $x = y^2$ não é uma função $y = f(x)$, pois não passa no teste da reta vertical. Contudo, pode ser resolvida para y .

$$f_1(x) = +\sqrt{x}$$

$$f_2(x) = -\sqrt{x}$$


Exemplo 1

O gráfico da equação $x = y^2$ não é uma função $y = f(x)$, pois não passa no teste da reta vertical. Contudo, pode ser resolvida para y .

$$f_1(x) = +\sqrt{x}$$

$$f_2(x) = -\sqrt{x}$$

Assim, $x = y^2$ define implicitamente as funções: f_1 e f_2 .



Diferenciação implícita

- Muitas vezes, não é necessário resolver a equação de y em função de x para diferenciar funções definidas explicitamente;
- Exemplo simples: $xy = 1$

Exemplo 2

Encontrar $\frac{dy}{dx}$ na equação: $5y^2 + \operatorname{sen}y = x^2$

Exercício

Encontrar $\frac{dy}{dx}$ na equação: $y + \operatorname{sen} y = x$

Teorema de L'Hôpital

The background is a dark green chalkboard filled with faint, white mathematical content. It includes various calculus formulas such as the chain rule $\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$, the product rule $\frac{d}{dx} (uv) = u'v + uv'$, and the quotient rule $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. There are also geometric diagrams, including a sphere with intersecting great circles and a 3D coordinate system with axes.

Teorema de L'Hôpital

- É um método para se obter limites utilizando derivadas;
- Usado em programas computacionais para cálculo de muitos limites;

Teorema de L'Hôpital

- É um método para se obter limites utilizando derivadas;
- Usado em programas computacionais para cálculo de muitos limites;
- O Teorema simplifica os cálculos;
- Porém, não é aplicável em qualquer caso.

Formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$

➤ Um limite da forma:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

➤ Em que $f(x) \rightarrow 0$ e $g(x) \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow a$ é denominado **forma indeterminada do tipo $\frac{0}{0}$** ;

Formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$

- Um limite da forma:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

- Em que $f(x) \rightarrow 0$ e $g(x) \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow a$ é denominado **forma indeterminada** do tipo $\frac{0}{0}$;
- **Exemplos resolvidos pelas técnicas normais:**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}x}{x} = 1$$

Formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$

- Contudo, há muitas formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$ nas quais, nem o método algébrico, nem o geométrico resolvem o limite;

Formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$

- Contudo, há muitas formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$ nas quais, nem o método algébrico, nem o geométrico resolvem o limite;
- **Por exemplo:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^3}$$

Formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$

➤ Contudo, há muitas formas indeterminadas do tipo $\frac{0}{0}$ nas quais, nem o método algébrico, nem o geométrico resolvem o limite;

➤ Por exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^3}$$

➤ Ao substituir “0” teremos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. Como resolver esse limite?

Formas indeterminadas do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

- Os limites da razão $\frac{f(x)}{g(x)}$ nos quais o numerador e o denominador têm como resultados ∞ é chamado forma indeterminada do tipo $\frac{\infty}{\infty}$;

Formas indeterminadas do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

➤ Os limites da razão $\frac{f(x)}{g(x)}$ nos quais o numerador e o denominador têm como resultados ∞ é chamado forma indeterminada do tipo $\frac{\infty}{\infty}$;

➤ Exemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x - 1}$

Formas indeterminadas do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

➤ Os limites da razão $\frac{f(x)}{g(x)}$ nos quais o numerador e o denominador têm como resultados ∞ é chamado forma indeterminada do tipo $\frac{\infty}{\infty}$;

➤ Exemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x - 1}$

➤ Não é óbvio calcular esse limite, pois ambos, numerador e denominador assumem valores sem cota quando $x \rightarrow \infty$.

Formas indeterminadas do tipo

$\frac{\infty}{\infty}$

- Exemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x - 1}$
- Nesse exemplo há uma disputa entre numerador e denominador;

Formas indeterminadas do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

- Exemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x - 1}$
- Nesse exemplo há uma disputa entre numerador e denominador;
- Se o numerador ganhar, o limite resulta ∞ ;
- Se o denominador ganhar, a resposta será 0 ;

Formas indeterminadas do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

- Exemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x - 1}$
- Nesse exemplo há uma disputa entre numerador e denominador;
- Se o numerador ganhar, o limite resulta ∞ ;
- Se o denominador ganhar, a resposta será 0 ;
- Pode ainda haver equilíbrio e o limite resultar em um número finito diferente de zero;

Formas indeterminadas do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

- **Exemplo:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x - 1}$
- Nesse exemplo há uma disputa entre numerador e denominador;
- Se o numerador ganhar, o limite resulta ∞ ;
- Se o denominador ganhar, a resposta será 0 ;
- Pode ainda haver equilíbrio e o limite resultar em um número finito diferente de zero;
- Como as formas tradicionais não funcionam, o Teorema de L'Hôpital será aplicado.

Teorema de L'Hôpital forma $\frac{0}{0}$

3.6.1 TEOREMA (*Regra de L'Hôpital para a Indeterminação 0/0*) Suponha que f e g sejam funções diferenciáveis em um intervalo aberto que contenha $x = a$, exceto, possivelmente, em $x = a$, e que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad e \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

Se existir $\lim_{x \rightarrow a} [f'(x)/g'(x)]$, ou se esse limite for $+\infty$ ou $-\infty$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Além disso, essa afirmação também vale no caso de um limite com $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow -\infty$ ou $x \rightarrow +\infty$.

Teorema de L'Hôpital forma $\frac{\infty}{\infty}$

3.6.2 TEOREMA (*Regra de L'Hôpital para a Indeterminação ∞/∞*) Suponha que f e g sejam funções diferenciáveis em um intervalo aberto que contenha $x = a$, exceto, possivelmente, em $x = a$, e que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad e \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

Se existir $\lim_{x \rightarrow a} [f'(x)/g'(x)]$, ou se esse limite for $+\infty$ ou $-\infty$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Além disso, essa afirmação também vale no caso de um limite com $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow -\infty$ ou $x \rightarrow +\infty$.

Exemplo 1 Solução pela regra de L'Hôpital

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^3}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x-1}$$

Outra formas de indeterminação

A. Forma do tipo $(0 \cdot \infty)$

- A relação $0 \cdot \infty$ não é um produto de números;
- Os limites desta forma deverão ser transformados para a forma $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

Outra formas de indeterminação

B. Forma do tipo $(\infty - \infty)$

- Os limites que levam a essa forma são indeterminados, pois os dois termos exercem influências conflitantes;
- Um termo leva na direção positiva e o outro para negativa.
- As formas $\infty - \infty$ podem ser manipuladas para se obter as formas $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Outra formas de indeterminação

B. Forma do tipo $(\infty - \infty)$

Exemplo 2: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\text{sen}x} \right)$

Outra formas de indeterminação

C. Formas do tipo $(0^0; \infty^0; 1^\infty)$

- Essas formas podem ser manipuladas, introduzindo uma variável dependente e tomando-se \ln em ambos os lados da equação, para se obter as formas $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Outra formas de indeterminação

C. Formas do tipo $(0^0; \infty^0; 1^\infty)$

- Essas formas podem ser manipuladas, introduzindo uma variável dependente e tomando-se \ln em ambos os lados da equação, para se obter as formas $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x}$

Outra formas de indeterminação

C. Formas do tipo $(0^0; \infty^0; 1^\infty)$

- Essas formas podem ser manipuladas, introduzindo uma variável dependente e tomando-se \ln em ambos os lados da equação, para se obter as formas $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x}$

$$y = (1 + x)^{1/x}$$

Outra formas de indeterminação

C. Formas do tipo $(0^0; \infty^0; 1^\infty)$

- Essas formas podem ser manipuladas, introduzindo uma variável dependente e tomando-se \ln em ambos os lados da equação, para se obter as formas $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x}$

$$y = (1 + x)^{1/x} \Rightarrow \ln y = \ln(1 + x)^{1/x}$$

Outra formas de indeterminação

C. Formas do tipo $(0^0; \infty^0; 1^\infty)$

- Essas formas podem ser manipuladas, introduzindo uma variável dependente e tomando-se \ln em ambos os lados da equação, para se obter as formas $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x}$

$$y = (1 + x)^{1/x} \Rightarrow \ln y = \ln(1 + x)^{1/x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1 + x)^{1/x}$$

Outra formas de indeterminação

C. Formas do tipo $(0^0; \infty^0; 1^\infty)$

- Essas formas podem ser manipuladas, introduzindo uma variável dependente e tomando-se \ln em ambos os lados da equação, para se obter as formas $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$;

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x}$

$$y = (1 + x)^{1/x} \Rightarrow \ln y = \ln(1 + x)^{1/x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1 + x)^{1/x}$$

Continuar como exerc.

Resp.: $e = 2,71\dots$

Para depois desta aula:

- Rer ler o capítulo no livro texto.
- Resolver os exemplos dados em aula.
- Fazer a lista de exercícios.


Próxima aula:

- Derivada Funções logarítmicas e exponenciais.

Bibliografia

1. ANTON, Howard; BIVENS, Irl C.; DAVIS, Stephen L. Cálculo - volume 1. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2007.

Figuras. ANTON, Howard; BIVENS, Irl C.; DAVIS, Stephen L. Cálculo – v.1. 10. ed. São Paulo: Bookman, 2014.



Contatos e material de apoio

profhenriquefaria.com



henrique.faria@unesp.br