

Seguridad en las ceremonias y directrices médicas

Precauciones médicas importantes

Ricardo tiene muchos años de experiencia en la celebración de eventos de medicina y conoce el uso seguro de Ayahuasca en su contexto tradicional. Tenga en cuenta que, en ciertos casos, trabajar con Ayahuasca puede conllevar riesgos para la salud: si tiene problemas cardíacos, hepáticos o renales o otros problemas médicos graves, debe informarnos a la primera oportunidad y discutir los problemas con un médico conocedor de los problemas que Ayahuasca puede plantear.

Nuestra prioridad es su seguridad y bienestar, dentro de los eventos que lo guíen hacia la sanación y el crecimiento personal. Proporcionaremos el entorno más seguro para trabajar con Ayahuasca que podamos, y aseguraremos su bienestar lo mejor que podamos en todo momento. A cambio le pedimos que se comporte de manera responsable y que no se ponga en peligro ni a usted mismo ni a los demás.

Es necesario que acepte divulgar, en confianza, cualquier condición médica conocida y / o uso de cualquier medicamento, en el momento de la reserva. Al asistir al evento de medicina, declara que se encuentra en una condición física y mental adecuada para las actividades descritas en las pautas dietéticas y médicas, y acepta participar bajo su propio riesgo y que no podemos aceptar responsabilidad por ningún accidente o lesión. Se ha encontrado que ciertos medicamentos no son compatibles con Ayahuasca. Es esencial dejar de tomar las siguientes sustancias y darle a su sistema tiempo suficiente para eliminarlas del cuerpo antes de comenzar un taller. Consulte a su médico si tiene alguna duda: sin duda, no debe dejar de tomar los medicamentos recetados (incluidos los antidepresivos) sin consultar a su médico.

Los siguientes medicamentos son inseguros en combinación con Ayahuasca:

Cualquier medicamento que contenga inhibidores de la MAO. Se sabe que estos medicamentos causan efectos secundarios peligrosos cuando se toman junto con Ayahuasca. Es fundamental que deje de tomar estos medicamentos y deje suficiente tiempo para que su sistema se elimine de estas sustancias.

Cualquier medicamento que tenga un efecto sobre el sistema de serotonina, incluidos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (es decir, antidepresivos como Wellbutrin, Prozac, Zoloft, Effexor, etc.).

La combinación de estos medicamentos con Ayahuasca puede inducir el síndrome de serotonina, mucho más severamente que con alimentos que contienen triptófano y con resultados potencialmente fatales. Le aconsejamos que deje de tomar medicamentos ISRS seis semanas antes de un taller para permitir que el sistema desaparezca a tiempo; algunos de estos medicamentos pueden causar efectos secundarios cuando deja de tomarlos, y debe dejar suficiente tiempo para que desaparezcan. No debe dejar de tomarlos abruptamente sin discutir el asunto con su médico. Tenga en cuenta que el antidepresivo herbal St. John's Wort (*Hypericum Perforatum*) tampoco debe tomarse directamente antes de trabajar con Ayahuasca, aunque el sistema puede aclarar esto en 2 semanas antes de comenzar un taller.

Otros medicamentos que debe suspender son descongestionantes, medicamentos para el resfrío, medicamentos para la alergia, antihistamínicos, sedantes, tranquilizantes, anfetaminas (incluido

Adderall), algunos medicamentos para la hipertensión, aminos simpaticomiméticos como pseudoefedrina y efedrina, carbamazepina, metilfenidato (Ritalin), macromerina, fenilalanina, tirosina, triptófano, asarona / cálamo, inhaladores para el asma y pastillas para adelgazar. Aunque no se ha encontrado que la ayahuasca cause psicosis y otras alteraciones psiquiátricas, puede ser peligroso para las personas con antecedentes de problemas psicológicos. Díganos, en confianza, sobre cualquier historial de problemas de salud mental.

Si tiene una afección cardíaca o presión arterial alta crónica, no puede ser aceptado

Si tiene una enfermedad cardíaca o presión arterial alta crónica, no puede ser aceptado en un evento.

No es seguro tomar Ayahuasca cuando está embarazada después de 5 meses de embarazo. Antes de que puedas beber el primer mes una porción promedio y después del primer mes algunos sorbos para conectarte con la planta y el espíritu del feto.

Nota especial para diabéticos: los IMAO pueden cambiar la cantidad de insulina o medicamento antidiabético oral que necesita. Si es diabético, póngase en contacto con nosotros primero antes de hacer una reserva para analizar su caso particular.

Aconseje sobre medicamentos y medicamentos para evitar cuando trabaje con Ayahuasca: esta es una página de información exhaustiva de pautas de interacción médica, botánica y nutricional provistas por los Foros de Ayahuasca.

En general, desde la perspectiva tradicional de los curanderos de plantas amazónicas, cuando un paciente o un aprendiz trabaja con plantas medicinales, especialmente Ayahuasca y otras plantas medicinales importantes como Chiric Sanango, Wayracaspi, Toé, etc., es preferible no tomar ninguna otra sustancia o medicamentos, ya que puede causar cutipado, o en otras palabras interferir con la energía de las plantas y provocar reacciones no deseadas.

Es importante suspender cualquier tipo de psicofármacos y tratamientos de depresión farmacéutica entre 14 y 35 días antes de beber Ayahuasca. Se ofrecen consejos más específicos sujetos a proporcionar detalles de la medicación particular en cuestión.

Antes de reservar para ir a un evento, es importante que tengamos la divulgación completa de todos los medicamentos / medicamentos y el tiempo que los invitó / voluntario.

Los participantes con afecciones hepáticas deben consultar primero con nosotros y proporcionar más información sobre la condición hepática. Las personas con tuberculosis no deben tomar Ayahuasca.

Estas drogas y medicamentos son potencialmente peligrosos con IMAO:

Otros IMAO

ISRS (cualquier inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina)

Antihipertensivos (medicamento para la presión arterial alta)

Supresores del apetito (pastillas para adelgazar)

Medicina para el asma, bronquitis u otros problemas respiratorios; antihistamínicos, medicamentos para los resfriados, problemas sinusales, fiebre del heno o alergias (Actifed DM, Benadryl, Benylin, Chlor-Trimeton, Compoz. Estos incluyen Bromarest-DM o-DX, jarabe para la tos Dimetane-DX, Dristan Cold & Flu, Phenergan con Dextrometorfano, Robitussin-DM, Vicks, fórmula 44-D, varios preparados

Tylenol para el resfriado, la tos y la gripe, y muchos otros, cualquier medicamento con DM o Tuss en su nombre).

Depresores del SNC (sistema nervioso central)

Antipsicóticos

Barbitúricos

Alcohol

Drogas ilegales o recreativas que son muy peligrosas para combinar con IMAO:

Cocaína

Anfetaminas (meth-, dex-, anfetamina)

MDMA (éxtasis)

MDA

MDEA

PMA

Dextrometorfano (DXM)

Drogas ilegales o recreativas que pueden ser peligrosas para combinar con IMAO:

Opiáceos

Mescalina (cualquier fenetilamina)

Barbitúricos

Otros psicoactivos que no se deben combinar con IMAO:

Kratom

Kava

Nota sobre la interacción con la marihuana:

Fumar marihuana antes de la sesión de Ayahuasca puede embrutecer y oscurecer la experiencia general actuando como un bloqueo para que la planta visionaria se manifieste de la manera más completa. Dada la sensibilidad general amplificada de todos los participantes de la sesión de Ayahuasca, la marihuana afecta negativamente no solo a la persona que la usó, sino también a las experiencias de otros participantes así como también al nivel de energía general del círculo de medicina.

Algunos medicamentos farmacéuticos específicos que no se deben combinar con IMAO (algunos son riesgos leves, otros graves):

Actifed

Adderall

Alaproclate

Albuterol (Proventil, Ventolin)

Amantadine hydrochloride (Symmetrel)

Amineptine

Amitriptyline

Amoxapine (Asendin)

Atomoxetine

Befloxedone

Benadryl

Benylin

Benzedrine

Benzphetamine (Didrex)

Bicifadine

Brasofensine

Brofaromine

Bupropion (Wellbutrin)

Buspirone (BuSpar) Butriptyline

Carbamazepine (Tegretol, Eptol)

Chlorpheniramine

ChlorTrimeton

Cimoxetone

Citalopram

Clomipramine (Anafranil)

Codeine

Cyclobenzaprine (Flexeril)

Cyclizine (Marezine)

Dapoxetine
Desipramine (Pertofrane, Norpramin)
Desvenlafaxine
Dextroamphetamine (Dexedrine)
Dextromethorphan (DXM)
Dibenzepin
Dienolide kavapyrone desmethoxyyangonin
Diethylpropion
Disopyramide (Norpace)
Disulfiram (Antabuse)
Dopamine (Intropin)
Dosulepin
Doxepin (Sinequan)
Duloxetine
Emsam
Ephedrine
Epinephrine (Adrenalin)
Escitalopram
Femoxetine
Fenfluramine (Pondimin)
Flavoxate Hydrochloride (Urispas)
Fluoxetine (Prozac)
Fluvoxamine
Furazolidone (Furoxone)
Guanethedine
Guanadrel (Hylorel)
Guanethidine (Ismelin)
Hydralazine (Apresoline)
5Hydroxytryptophan
Imipramine (Tofranil)
Iprindole

Iproniazid (Marsilid, Iprozid, Ipronid, Rivivol, Propilniazida)

Iproclozide

Isocarboxazid (Marplan)

Isoniazid (Laniazid, Nydrazid)

Isoniazidrifampin (Rifamate, Rimactane)

Isoproterenol (Isuprel)

Ldopa (Sinemet)

Levodopa (Dopar, Larodopa)

Linezolid (Zyvox, Zyvoxid) • Lithium (Eskalith)

Lofepamine

Loratadine (Claritin)

Maprotiline (Ludimil)

Medifoxamine

Melitracen

Meperidine (Demerol)

Metaproterenol (Alupent, Metaprel)

Metaraminol (Aramine)

Methamphetamine (Desoxyn)

Methyldopa (Aidomet)

Methylphenidate (Ritalin)

Mianserin

Milnacipran

Minaprine

Mirtazapine (Remeron)

Moclobemide

Montelukast (Singulair)

Nefazodone

Nialamide

Nisoxetine

Nomifensine

Norepinephrine (Levophed)

Nortriptyline (Aventyl)
Oxybutyninchloride (Ditropan)
Oxymetazoline (Afrin)
Orphenadrine (Norflex)
Pargyline (Eutonyl)
Parnate
Paroxetine (Paxil)
Pemoline (Cylert)
Percocet
Pethedine (Demerol)
Phendimetrazine (Plegiline)
Phenergen
Phenmetrazine
Phentermine
Phenylephrine (Dimetane, Dristandecongestant, NeoSynephrine)
Phenylpropanolamine (in many cold medicines)
Phenelzine (Nardil)
Procarbazine (Matulane)
Procainamide (Pronestyl)
Protriptyline (Vivactil)
Pseudoephedrine
Oxymetazoline (Afrin)
Quinidine (Quinidex)
Rasagiline (Azilect)
Reboxetine
Reserpine (Serpasil)
Risperidone, Salbutamol
Salmeterol
Selegiline (Eldepryl)
Sertraline (Zoloft)
Sibutramine

Sumatriptan (Imitrex)
Terfenadine (SeldaneD)
Tegretol
Temaril
Tesofensine
Theophylline (TheoDur)
Tianeptine
Toloxatone
Tramidol
Tranlycypromine (Parnate)
Trazodone
Tricyclic antidepressants (Amitriptyline, Elavil)
Trimipramine (Surmontil)
Triptans
Vanoxerine
Venlafaxine (Effexor)
Viloxezine
Yohimbine
Zimelidine
Ziprasidone (Geodon)

Also avoid the following herbs:

St. John's Wort
Kava
Kratom
Ephedra
Ginseng
Yohimbe
Sinicuichi
Rhodiola Rosea
Kanna

Boswellia

Nutmeg

Scotch Broom

Licorice Root

El uso de estimulantes con IMAO es particularmente peligroso y puede ser potencialmente mortal. El consumo de cocaína, anfetaminas o MDMA (éxtasis) con IMAO puede causar un aumento severo de la presión arterial, lo que aumenta las posibilidades de sufrir una apoplejía y hemorragia cerebral y posibilita la sobredosis de una cantidad relativamente pequeña de cocaína. (A fatalidad ha sido registrado que implica la combinación de Peganum harmala y la cocaína. Las muertes que resultan de la combinación de anfetaminas con IMAO farmacéutica se registran en la literatura médica.) Uso de otros antagonistas de la serotonina o precursores con un IMAO puede conducir al síndrome de la serotonina.

El principal síntoma de síntoma de serotonina puede ser un dolor de cabeza grave y de larga duración (el mismo síntoma como la interacción triptamina MAOI) y / o fiebre (tan alto como 40 ° C / 104 ° o más F) Otros síntomas de síndrome de la serotonina puede incluir rápida latidos del corazón, escalofríos, sudoración, dilatación de las pupilas, temblores intermitentes, reflejos hiperactivos o excesivamente sensibles, ruidos intestinales hiperactivos, presión arterial alta. El síndrome de serotonina grave puede provocar shock, delirio agitado, rigidez muscular y tensión muscular elevada, insuficiencia renal, convulsiones y puede poner en peligro la vida.

El uso de antidepresivos tricíclicos dentro de las dos semanas posteriores a la toma de IMAO puede causar efectos secundarios graves, como fiebre repentina, presión arterial extremadamente alta, convulsiones y la muerte.

El uso de Fluoxetine (Prozac) dentro de las cinco semanas posteriores a la toma de IMAO puede causar fiebre alta, rigidez, presión arterial alta, cambios mentales, confusión e hipomanía.

Usando Benzedrine, Benzphetamine, desipramina, Desoxyn, Dexedrine, la dopamina, la efedrina (contenida en Marax, Quadrinal, y otros medicamentos para el asma), la epinefrina, Guanadrel, guanetidina, hidralazina, isoproterenol, L-dopa, Metaraminol, metildopa, Mirtazamine, norepinefrina oximetazolina, phendimetrazina, fentermina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, Ritalin, o venlafaxina con inhibidores de la MAO puede causar una crisis hipertensiva (spike severa en la presión arterial).

Usar Adderall con IMAO puede provocar una temperatura corporal alta, convulsiones y, en algunos casos, coma.

El uso de Bupropion (Wellbutrin) dentro de las dos semanas posteriores a la toma de IMAO puede causar efectos secundarios graves, como convulsiones. El uso de Buspirone (Buspar) con IMAO puede causar presión arterial alta y aumento de los efectos sedantes. El uso de carbamazepina (Tegretol) con inhibidores de la MAO puede provocar fiebre y puede aumentar las convulsiones, especialmente en epilépticos. El uso de Clomipramina con IMAO puede causar fiebre alta (crisis hiperpiróxica) y convulsiones. El uso de depresores del SNC con inhibidores de la MAO puede aumentar los efectos depresores.

El uso de Desipramina (Norpramin, Pertofrane) con inhibidores de la MAO puede provocar crisis hipertensivas.

El uso de Dextrometorfano con IMAO puede causar excitación, presión arterial alta y fiebre, o episodios breves de psicosis.

El uso de fenfluramina con IMAO puede provocar fiebre (crisis hiperpiróxica). El uso de Kava con IMAO puede provocar una crisis hipotensora (caída severa de la presión arterial). El uso de litio con IMAO puede causar fiebre y síndrome de serotonina. El uso de meperidina (Demerol) con IMAO farmacéuticos ha provocado la muerte de una sola dosis. El uso de Metaproterenol u otros broncodilatadores beta-adrenérgicos con IMAO puede causar elevación de la presión arterial y ritmo cardíaco acelerado. El uso de Mirtazapina (Remeron) con IMAO puede provocar crisis hipertensivas. El uso de Nefazodona (Serzone) puede provocar fiebre alta. El uso de Temaril con IMAO puede aumentar la posibilidad de efectos secundarios. El uso de Terfenadine con IMAO puede causar un aumento en los niveles sanguíneos de IMAO. El uso de Theophylline con IMAO puede causar latidos cardíacos rápidos y ansiedad. El uso de Trazodona (Desyrel) con IMAO puede provocar fiebre alta. El uso de triptófano o L-triptófano con inhibidores de la MAO puede causar desorientación, confusión, amnesia, agitación delirante, deterioro de la memoria, signos hipomaniacos, escalofríos. El uso de Venlafaxine (Effexor) con IMAO puede provocar una crisis hipertensiva. El uso de Ziprasidone (Geodon) con IMAO puede causar el síndrome de serotonina. El uso de alcohol con inhibidores de la MAO puede causar efectos secundarios como angina (dolor de pecho) o dolores de cabeza. El dolor de cabeza puede enmascarar o confundirse con una crisis hipertensiva causada por la interacción de MAOI. Los IMAO también pueden aumentar el efecto sedante del alcohol. El uso de opiáceos con IMAO conlleva un riesgo de depresión respiratoria. El uso de diuréticos con IMAO puede causar una mayor disminución de la presión arterial de lo normal y un aumento en los niveles sanguíneos de IMAO. El uso de anestésicos con IMAO puede potenciar el efecto anestésico. El uso de pastillas para dormir, tranquilizantes (mayores o menores) o barbitúricos con IMAO puede aumentar el efecto sedante.