

# PROCÉDURE DE DÉSINFECTION AVEC **SPECTROL**

**NETTOYANT / DÉSODORISANT / DÉSINFECTANT / FONGICIDE  
MILDEWSTAT / VIRUCIDE / TUBERCULOCIDE**

## PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI

### PROCÉDURE

- 1** Avant d'appliquer le produit, enlever le plus gros de la saleté.
- 2** Au moment de la vaporisation, tenir la bouteille à 15 - 20 cm de la surface à désinfecter.
- 3** Vaporiser sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit bien couverte de produit.
- 4** Laisser un temps de contact de 10 minutes.
- 5** **Pour surfaces n'étant pas en contact avec les aliments :**

Essuyer avec un chiffon propre ou un papier essuie-mains.

#### **Pour surfaces en contact avec les aliments :**

Rincer adéquatement à l'eau potable toutes les surfaces destinées à un contact direct avec les aliments.

Essuyer avec un chiffon propre ou un papier essuie-mains.



3123

### APPLICATION DU PRODUIT

#### MATÉRIEL REQUIS



**Bouteille en milieu de travail**

**Vaporisateur**

### AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Nettoie et désinfecte en une seule opération.
- Ne nécessite aucun rinçage pour les surfaces n'étant pas en contact avec les aliments.
- N'abîme pas le verre, les plastiques, les métaux et la céramique.



#### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE (ÉPI)

Le port de gants est non obligatoire pour cette procédure mais suggéré lorsque cette procédure doit être appliquée fréquemment. Des lunettes de sécurité sont recommandées lorsque le produit est vaporisé sur des surfaces plus hautes que le niveau des yeux.