



Aqua Division

Vet Win
Vetwin International

CONQUEROR

Broad Spectrum Sanitizer



PRESENTATION : 1Lt, 5Lt, 20 Lt HDPE Container

COMPOSITION :

Conqueror	consists a combination of
Benzalkonium Chloride (BKC)	6-7%
Glutaraldehyde ($C_5H_8O_2$)	2-4%
Elemental Copper	5%
Formaldehyde	10%
Methyl Violet	0.5%
DM Water	Q.S.

BENEFITS :

- 1) Water sanitizer for Aquaculture Ponds.
- 2) Effective in all range of pH, temperature and salanities.
- 3) Reduces viral, protozoal, fungal, bacterial to the fullest extent without altering the water parameters
- 4) Eliminates bad odor and cleans the bottom of pond.

DOSAGE :

Fish & Shrimp :

1 lt per acre (5feet water depth)

2 ltrs depth is above 5 feet

(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :


Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

విశ్లేషణలు

- 1) చేపలు / రొయ్యల చెరువుల యొక్క వాటర్ శాన్టీర్.
- 2) చెరువు యొక్క ఆక్సిజన్ (జీవ వాయివు) శాతం మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపదు.
- 3) చెరువులలోని వ్యాధికారక, హనికారకమైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ప్రోటోజోవా ఫంగ్స్లను అంతమొందిస్తుంది.
- 4) చెరువులలోని నీటిని మరియు అడుగు భాగాన్ని అత్యంత ప్రభావశీలంగా శుభ్రం చేస్తుంది.
- 5) చేపలలో రెడ్ డిసీన్, డ్రాప్స్ EUDS, కాలమ్ నారీన్ వంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధులను మొదటి దశలో ఉన్నప్పుడు సమర్థవంతంగా నిర్మాలిస్తుంది.

TOPIDOX

Multifunction Disinfectant



PRESENTATION : 1Lt, 5Lt, 20 Lt HDPE Container

COMPOSITION :

Topidox consists a combination of	
Benzalkonium Chloride (BKC)	5-6%
Glutaraldehyde ($C_5H_8O_2$)	5%
Formaldehyde	3.5%
Xanthacridinium	0.1%
DM Water	Q.S.

BENEFITS :

- 1) Unique, new and powerful combination to destroy all pathogens.
- 2) Strong & powerful bactericide, fungicide, virucide and protozoocide.
- 3) Effective on gram - ve and gram +ve bacteria, bacterial spores and viruses.
- 4) Effective against wide range of pH, temperature and salanities.

DOSAGE :

Fish & Shrimp :
1lt per acre (5feet water depth)
2 ltrs depth is above 5 feet
(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

విశిష్ట లక్షణాలు

- 1) చేపలు / రొయ్యల చెరువుల యొక్క వాటర్ శానిటైర్.
- 2) రొయ్యలలో బ్యాక్టీరియా వలన వచ్చే జ్లాక్ గిల్,
- వైటగిల్ మొదలైన వాటిని పూర్తిగా నిర్మాలిస్తుంది.
- 3) చెరువులలోని వ్యాధికారక, హనికారకమైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ప్రోటోజోవా ఫంగ్స్‌లను అంతమొందిస్తుంది.
- 4) చెరువులలోని నీటిని మరియు అడుగు భాగాన్ని అత్యంత ప్రభావశిలంగా శుభ్రం చేస్తుంది.

KILLPER - C

6% w/v stabilised Bromine compound



PRESENTATION : 1Lt, 5Lt, 20 Lt HDPE Container

COMPOSITION :

Killper -C consists a combination of	
Myristyl Trimethyl	
Ammonium Bromide (MTAB) 12.5%	
Cetrimide Solution 3%	
Benzalkonium Chloride (BKC) 0.5%	
IsoPropyl Alcohol 1%	
Acriflavine 0.01%	
DM Water Q.S.	

BENEFITS :

- 1) Controls water pollution.
- 2) Cure all kind of diseases like tail rot, vibriosis, black grill, antenna rot, red diseases and grill diseases.
- 3) Effectively controls Viral, Bacterial, Protozoal and Fungal diseases.
- 4) Suppresses filamentous algae over re-production.

DOSAGE :

Fish & Shrimp :
1lt per acre (5feet water depth)
2 ltrs depth is above 5 feet
(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

విశ్లేషణలు

- 1) చేపలు / రొయ్యల చెరువుల యొక్క వాటర్ శానిటైర్.
- 2) చెరువు యొక్క ఆక్సిజన్ (జీవ వాయువు) శాతం మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపదు.
- 3) చెరువులలోని వ్యాధికారక, హోనికారకమైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ప్రోటోజోవా ఫంగ్స్లను అంతమొందిస్తుంది.
- 4) రొయ్యలలో బ్యాక్టీరియా వలన వచ్చే బ్లాక్ గిల్, వైట్గిల్ మొదలైన వాటిని పూర్తిగా నిర్మాణిస్తుంది.

BIOGREEN

Sanitiser cum disinfectant
for aqua culture ponds



PRESENTATION : 1Lt, 5Lt, 20 Lt HDPE Container

COMPOSITION :

Biogreen consists a combination of	
Benzalkonium Chloride (BKC)	6-7%
Glutaraldehyde ($C_5H_8O_2$)	2%
Elemental Copper	7.5%
Formaldehyde	7%
Aniline Green	0.5%
DM Water	Q.S.

BENEFITS :

- 1) It's a strong potent virucide, bactericide, fungicide and Anti Protozoan.
- 2) Controls the growth of excess algal bloom in pond water.
- 3) Suppresses filamentous algae over re-production.
- 4) Prevents all external bacterial and Viral diseases in fishes and shrimps.

DOSAGE :

Fish & Shrimp :

1lt per acre (5feet water depth)

2 ltrs depth is above 5 feet

(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.

Spray all over the pond uniformly.

విచిప్ప లక్ష్యాలు

- 1) బియోగ్రెన్లో ఉండే కాపర్ చేపల చెరువులలో తరచుగా వచ్చే అధిక నాచు, ఆల్గీ, చనిపోయిన ప్లాంక్టన్లను సమర్పంతంగా నిర్మాలించి, తిరిగి రాకుండా ఉండేలా చూసుకుంటుంది.
- 2) దీనిలో ఉండే ఇతర పద్ధత్లలు చెరువు నీటిలోని వ్యాధికారకమైన జీవులను, బ్యాక్టీరియాను, వైరస్లను చంపివేస్తుంది.
- 3) చెరువులలోని నీటిని మరియు అడుగు భాగాన్ని అత్యంత ప్రభావశిలంగా పుత్రం చేస్తుంది.
- 4) రొయ్యలలో బ్యాక్టీరియా పలన వచ్చే జ్లూక్ గిల్, వైట్గిల్ మొదలైన వాటిని పూర్తిగా నిర్మాలిస్తుంది.
- 5) చేపలలో రెడ్ డిసీన్, క్రాప్సీ EUDS, కాలమ్ నారిన్ వంట అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధులను మొదటి దశలో ఉన్నప్పుడు సమర్పంతంగా నిర్మాలిస్తుంది.

ACTION-3D

High-Powered Sanitizer



PRESENTATION : 1Lt, 5Lt, 20 Lt HDPE Container

COMPOSITION :

Iodien (I2)	1.5 - 2.5%
Benzalkonium Chloride (BKC 50)	14-16%
Formaldehyde	0.20 - 0.25%
Acriflavine	0.001%
DM Water	Q.S.

BENEFITS :

- 1) Prevents cross contamination to the new generation which has not developed the immunity to the pathogenic organisms that remain from the previous harvest.
- 2) Controls Viral, microbial, protozoal as well as fungal diseases like white spot, black place, covering death, vibriosis, black gill, tail rot, antenna rot, red illness, etc.,
- 3) Controls water pollution and improves water quality.
- 4) Protects the shrimp from secondary infection in case of wound caused by external damages.

DOSAGE :

Fish & Shrimp :

1lt per acre (5feet water depth)

2 ltrs depth is above 5 feet

(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.

Spray all over the pond uniformly.

విషపు లక్షణాలు

- 1) దీనిలో ఉండే ఇతర పదర్థాలు చెరువు నీటిలోని వ్యాధికారకమైన జీవులను, బ్యాక్టీరియాను, వైరస్లను చంపివేస్తుంది.
- 2) రొయ్యులలో బ్యాక్టీరియా పలన వచ్చే భ్లాక్ గిల్, షైగిల్ మొదలైన వాటిని పూర్తిగా నిర్మాలిస్తుంది.
- 3) చెపలలో రెడ్ డిసీన్, డ్రాష్ ఎస్స్ ఎస్ ఎస్ కాలమ్ నారీన్ వంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధులను మొదటి దశలో ఉన్నట్టుడు సమర్థవంతంగా నిర్మాలిస్తుంది.
- 4) చెరువులలోని నీటిని మరియు అడుగు భాగాన్ని అత్యంత ప్రభావశీలంగా పుత్రుం చేస్తుంది.



KILLPER
8% Acidified Bromine
5lt, 20 lt



INSOCARE
Formaldehyde-37.5% w/v
5lt, 20 lt



WINNER-50
Benzalkonium Chloride 50%
1lt, 5lt, 20 lt



WINNER-80
Benzalkonium Chloride 80%
1lt, 5lt, 20 lt



TWICE-O-DINE
Stabilised Iodine -2%
1lt, 5lt, 20 lt



TIK-20
Stabilised Iodine -20%
500ml, 1lt, 5lt

ELIMITIC Amitraz 12.5% EC

Composition :
Amitraz 12.5 % EC Dip concentrate(Liquid) IP (Vet)

Usage :

- Prevents gill flukes, trichodina, early stages of Argulus and other parasites in fish ponds.
- Ectoparasitic liquid with no harm to the fishes.
- Evaporates into the environment within 24 to 48 hours after application
- Gives good colour and condition to fish

Dosage :
100ml per acre (6ft water depth)

Presentation :
500ml, 1Litre aluminium containers.
(For use only in fish ponds)

DELTA SAFE PLUS Deltamethrin 1.75% EC

Composition :
Deltamethrin 1.75 % EC Dip concentrate(Liquid) IP (Vet)

Usage :

- Prevents gill flukes, trichodina, early stages of Argulus and other parasites in fish ponds.
- Ectoparasitic liquid with no harm to the fishes.
- Evaporates into the environment within 24 to 48 hours after application
- Gives good colour and condition to fish

Dosage :
100-200ml per acre (6ft water depth)

Presentation :
1Litre aluminium containers.
(For use only in fish ponds)

MINERVA-P

A Special Mineral Supplement
for shrimp Culture Ponds



PRESENTATION : 10kg Bucket & 25kg BOPP Bags

COMPOSITION :

Calcium	19%	L-Lysine	5000 mg
Phosphorous	8%	DL-Methionine	2500 mg
Magnesium as MgSO ₄	100 gm	Silicon dioxide	50 gm
Potassium as KCl	100 gm	Protease	600000 units
Sodium as NaCl	50 gm	Amylase	200000 units
Iron as FeSO ₄	50 gm	Lipase	150000 units
Manganese as MnSO ₄	25 gm	Cellulase	50000 units
Zinc as ZnSO ₄	25 gm	Phytase	50000 FYT
Borax	5000 mg	Hemicellulase	20000 units
Copper as CuSO ₄	1000 mg	Xylanase	10000 units
Sodium selenite	500 mg	Beta Mannanase	10000 units
Ammonium molybdate	500 mg	Glucosidase	50000 units
Cobalt sulphate	1000 mg	Paracoccus	500 billion spores

BENEFITS :

- 1) Creates a healthy environment for the growth of shrimp.
- 2) Enhances the Bio Mineralisation process in aquaculture ponds.
- 3) Prevents problems like loose shell, soft shell, body cramps etc of shrimp.
- 4) Stimulates and regulates the periodic moulting process of shrimps.
- 5) Helps in quick formation and hardness of complete shell for shrimps.

DOSAGE :

For salinity <10ppt:

10kg per acre every weekly

For salinity >20ppt:

10kg per acre for every 10days.

For mineral deficiency and high stocking density ponds: 15-20kg per acre

(or) as per the advice of senior aqua consultant.

APPLICATION :


Take recommend quantity dilute with with 40 to 50 times water and broadcast all over the pond uniformly.

విశ్లేషణలు

- 1) అధిక చిలేపెడ్ విలువ గల మినరల్స్ షెల్ నిర్మాణం వేగవంతం కావడానికి, హోల్యూమ్ అవడానికి దోహదుడుతుంది.
- 2) తక్కువ ఉపుదనం ఉన్న నీటిలో కూడా రొయ్యల్లో ఓస్టోర్చెగులఘన్ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తుంది.
- 3) నీరు నాణ్యతను మెరుగుపరస్తూ, చెరువులో ఆక్షిజన్ శాతాన్ని పెంచుతుంది.
- 4) ఒత్తిడి తొలగిస్తూ సెల్యూల్ జీవక్రియ, కండరాల ఉత్పత్తిని మెరుగుపరస్తుంది.

LIVOSOL

Liver Stimulants with
Growth Promoters and Toxin Binders



COMPOSITION :

Azadirachta indica	25 w/w %
Andrographis paniculata	25 w/w %
Curcuma longa	2 w/w %
Zingiber officinale	5 w/w %
Cuminum cyminum	5 w/w %
Trigonella foenum-graecum	5 w/w %
Syzygium aromaticum	3 w/w %
Terminia Bellerica	30 w/w %
Excipients & Stabilisers	Q.S.

BENEFITS :

- 1) Corrects disorders of Liver and Spleen.
- 2) Prevents and treats the diseases like Hepatitis, rotten liver, white liver etc.
- 3) Makes Crude protein and Amino acid digestible.

DOSAGE :

Fish: 5kg per ton feed. Weekly twice.

Shrimp: 10-20 gm per kg of feed.

APPLICATION :

Take recommend quantity of Livosol, for mash feed in fish mix directly
For pellet feed use along with feed binder gel (Windol)

విశ్లేషణలు

- 1) లివర్ మరియు స్ప్లీన్ యొక్క అవలక్షణాలను సరిచేస్తుంది.
- 2) హెపటైటిస్, తెల్ల కాలేయం, కాలేయం ఉబ్బుట వంటి సమస్యలని అడ్డుకుంటుంది.
- 3) మేతలోని ప్రోటీన్సు మరియు సారాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకునేలా చేస్తుంది.
- 4) రెడ్ డిసీన్, కాలమ్ నారిన్, తాటాకు తెగులు వంటి వాటిని మొదటి దశలో ప్రభావితంగా నిరూపిస్తుంది.
- 5) లివోసాల్ ఒక అయుర్వేద ఉత్పత్తి కావడం వలన ఎటువంటి దుష్ప్రభావాల ఉండవు.

MINERVA -F

Feed minerals for Fish Culture



PRESENTATION : 10 Kg, 25 Kg Bag

COMPOSITION :

Calcium 36%
Phosphorous 14%
Magnesium sulphate 20gm
Potassium chloride 10gm
Manganese sulphate 20gm
Sodium chloride 10gm
Zinc sulphate 2gm
Copper sulphate 200mg
Ferrous sulphate 25gm
Cobalt sulphate 100mg
Sodium selenite 100mg
Ammonium Molybdate 100mg
Borax 5gm
L-Lysine 20gm
DL-Methionine 1000mg
Beta Glucans 1000mg
Mannan Oligosaccharides 1000mg
Spirulina 1mg
Yucca Schidigera 200mg
Bacillus Spp 2 million spores
Protease 600000 units
Amylase 200000 units
Lipase 150000 units
Cellulase 50000 units
Phytase 50000 FYT
Hemicellulase 20000 units
Xylanase 10000 units
Beta Mannanase 10000 units
Glucosidase 50000 units
Azadirachta indica 2500mg
Andrograph is paniculata 2500mg
Curcuma longa 200mg
Zingiber officinale 500mg
Cuminum cyminum 500mg
Trigonella foenum-graecum 500mg
Syzygium aromaticum 300mg
Terminia Bellerica 3000mg

DOSAGE :

Fish: 10kg per ton feed. Weekly twice.

APPLICATION :

Take recommend quantity of Minerva-F,
For mash feed mix directly
For pellet feed use along with
feed binder gel (Windol)

BENEFITS :


1. Regular usage helps in preventing the incidences of 5 common Non-Infectious Diseases.
2. Improves Feed efficiency, Growth rate and enhances weight gains in fish,
3. Improves blood circulation and increases haemoglobin levels.
4. Enhances digestion & feed assimilation.
5. Prevents De-Pigmentation and improves colour of the fish.
6. Prevents incidences of Fin Erosions, External Hemorrhages and erratic swim behaviour.

విశ్లేషణలు

- 1) చేపలు వేగవంతంగా ఎదగడానికి మరియు బరువు పెరగడానికి దోహదపడుతుంది.
- 2) చేపలలో విటమిన్ మరియు మినరల్ లోపాల వలన వచ్చే 5 రకాలైన వ్యాధులను సమర్పించంగా నివారిస్తుంది.
- 3) ఆకలిని మరియు అరుగుదల శక్తిని పెంపాందించి సహజ ఆపోరం (ప్లాంక్టన్) ఎక్కువ తీసుకునేలా తోడ్పడుతుంది.
- 4) పిగ్గింటేషన్లో లోపాన్ని సరి చేసి చేపని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.

ALLISMAX

12% w/w Garlic Extract



PRESENTATION :
500gm, 1 kg HDPE Container

COMPOSITION :

Allicin Extract Powder	12%
Echinacea	3%
DCP	25%
MOS	2%
1.3 beta glucans	2%
Active Ingredient & Carrier	QS

BENEFITS :

- 1) Arrest the growth of pathogenic bacteria in the shrimp gut.
- 2) Enhances PO (Phenoloxidase) Immune response.
- 3) Ensure healthy balance of digestive flora in shrimp
- 4) Develops Better Skeletal and muscle strength.

DOSAGE :

Shrimp:

Regular use:

5-10 gm per kg of feed.

During severe conditions:

10-20 gm per kg of feed in the 2nd meal

APPLICATION :


Take recommend quantity of Allis-Max use along with feed binder gel (Windol)

విశ్లేషణలు

- 1) ALLICIN వెల్లుల్లి యొక్క అత్యంత పనిచేసే భాగం. తాజా వెల్లుల్లిలో దీని శాతం 0.4% ఉంటుంది. ALLIS MAX 0.4కి బదులుగా 12% పంపిణీ చేస్తుంది.
- 2) రొయ్య యొక్క శరీరానికి రక్కణ కవచంగా ఉంటుంది. PhenolOxidase (PO) రోగ నిరోధక ప్రతిస్పందనను మొరుగుపరుస్తుంది.
- 3) రొయ్య శరీరం నుంచి పోషకాల పారగమ్యతను మొరుగుపరస్తుంది.
- 4) హానికరమైన క్రిములు మరియు వ్యాధుల నుంచి పూర్తి రక్కణ కలిగిస్తుంది.

WINDOL

Feed binding Gel



PRESSENTATION : 5lt, 20lt HDPE Container

COMPOSITION :

A Special formulation with binding compounds and attractant flavours

BENEFITS :

- 1) Enhances the Durability and Stability of pellet feed.
- 2) Increases Growth and Weight gains.
- 3) Acts as strong attractant and reduces wastage of pellet feed.

DOSAGE :

30-40 ml per kg of pellet feed.

APPLICATION :

Take recommended quantity of windol mix the supplements in the gel and apply to feed. Dry the feed in shade for 30minutes for super fine film coating.

విశ్లేషణలు

- 1) మేతను వృధా కాకుండా తగ్గిస్తుంది.
- 2) రొయ్యలు వేగవంతంగా ఎదగడానికి మరియు బరువు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది..
- 3) దీనిలోని ఆకర్షణీయ పదార్థాల వలన రొయ్యలు మేతను త్వరగా తీసుకుంటాయి.

VINSTAR-C

Immunity Enhancer



PRESENTATION :

500 gm, 1KG HDPE Container

COMPOSITION :

100% Pure Ascorbic Acid Coated.

DOSAGE :

5-10gm per kg of feed.

From 1st day of culture.

APPLICATION :

Take recommend quantity of Vinstar-C use along with feed binder gel (Windol)

BENEFITS :

- 1) Exponentially Improves the immunity power
- 2) Raises FCR and growth rate
- 3) Promotes calcium absorption in-turn avoids skeletal deformities.

విశిష్ట లక్షణాలు

- 1) రొయ్యలలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపాందిస్తుంది.
- 2) పిగ్గుంటేషన్ లోపాన్ని సరి చేసి చేపని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది..
- 3) కాల్చియమ్ అబ్సర్షన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. తద్వారా ఎదుగుదల తొందరగా వస్తుంది.
- 4) విన్స్టార్ - సి లోని విటమిన్ సి రొయ్య శరీరం లోపలలో కల అమ్లులలో మాత్రమే కరుగుతుంది.

TRUTONE

Liquid organic acids for healthy gut



PRESENTATION :

1 lt, 5lt HDPE Container

COMPOSITION :

Mixture of highly effective liquid organic acids.

DOSAGE :

Preventive purpose: 5-10ml per kg of feed.
Every day in the 2nd meal.

Curative purpose: 20ml per kg of feed in the 2nd meal for 7-10days after that 10ml daily and continue till harvest.

APPLICATION :

Take recommend quantity of Trutone use along with feed binder gel (Windol)

BENEFITS :

- 1) Inhibits the Pathogenic Bacterial Growth in aquatic species.
- 2) Stabilises the Gastrointestinal microflora.
- 3) Prevents Vibriosis, White Faecal Incidence.
- 4) Increases Growth and Survival rate in aquatic species.
- 5) Reduces Gut pH by Dissolution of Acids.
- 6) Increases Protein Hydrolysis which results in good FCR.

విశ్లేషణలు

- 1) వైట్ గట్ ఇంకా తేలియాడే వైట్ ఫీకల్ పదార్థాలను నివారిస్తుంది.
- 2) రాయ్ గట్లో గల హోనికారకమైన బాక్టీరియాలను అంతమొందిస్తుంది.
- 3) గట్ pH ను సరి చేసి అదుపులో (4-5) మధ్యలో ఉంచుతుంది..
- 4) రాయ్లలో పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. మేతలోని ప్రోటీన్ ను సమర్థవంతంగా ఆరగించుకుని రాయ్ ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చూసుకుటుంది.

ACRON GEL

Feed Attractant Binding Gel



PRESENTATION : 5lt, 20lt HDPE Container

COMPOSITION :

Vitamin E	20mg
Lysine	50mg
Protein Hydrolysate	20mg
Zinc	200-250mg
Ferrous	10-20mg
Cobalt	3-5 mg
Copper	3-5 mg
Selenium	1-2 mg
Potassium	5-7 mg
Magnesium	5-7 mg
Iodine	0.1-0.2mg
Excipients & stabilizers	q.s

DOSAGE :

30-40 ml per kg of pellet feed.

APPLICATION :

Take recommended quantity of AcronGel, mix and apply to feed. Dry the feed in shade for 30minutes for super fine film coating.

BENEFITS :

- 1) Plays a significant role in prevention of anaemia and acts as a coenzyme in energy metabolism.
- 2) Potentiates the immune mechanism.
- 3) It is a smooth gel with firm grip and doesn't dissolve easily when added to water.
- 4) Assists the formation of bones.

విశ్లేషణలు

- 1) రొయ్యలలో వచ్చే రక్తహీనతను తగ్గిస్తుంది.
- 2) దీనిలో ఉండే మిసరల్స్ క్రియాల నివారిస్తుంది.
- 3) రొయ్యలలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపాందిస్తుంది.
- 4) దీనిలో ఉండే ఫిబ్ అయిల్ రొయ్యలను మేత వైపు వరుగైతుని వచ్చేలా చేస్తుంది.
- 5) రొయ్య యొక్క షెల్ ఇంకా ఎదుగుదలకి అత్యంత ప్రభావశీలంగా చేస్తుంది.

PROLACT-PS

Photosynthetic Bacteria in Liquid form



PRESENTATION : 5Lt, 20Lt HDPE Container

COMPOSITION :

Potency 1 billion CFU / ml
 Live Beneficial Bacteria
 Rhodobacter
 Rhodococcus
 Paracoccus
 Bacillus spp.

BENEFITS :

- 1) Prevents foul soil odour and improves taste of suclture.
- 2) Decompose Organic Sludge (excess+ feed, dead planktons, excrete)
- 3) Reduces BOD, COD, NH3, NO2 etc.
- 4) Utilises H2S and decreases its level in the water column and osil.
- 5) Prevents Vibrio species and the occurrence of Luminous bacteria (LB).

DOSAGE :

Fish/Shrimp: 4-5litre per acre.

For fish tanks monthly once.

For shrimp ponds weekly once.

APPLICATION :

Take 1 liter PROLACT-PS 1kg.

Feed + 250gr. Jagggery + 50gr.


Yeast + 5 Liters drinking water. Mix all the above and aerate with an Aquarium air pump for eight hours and broadcast morning between 9.00 am to 11.00 am

విశ్లేషణలు

- 1) చెరువు యొక్క అడుగు భాగంలో గల మురుగుడు మరియు బురదను తొలగిస్తుంది
- 2) వాతావరణ విపరీత పరిస్థితిలో నీటి యొక్క pH, అమ్మానియా మొదలగు వాటని అదుపులో ఉంచుతుంది.
- 3) చెరువుకి అవసరమైన సూక్ష్మజీవాలు (useful bacteria), ప్లాంక్టన్ అధికంగా ఉప్పుత్తి చేస్తుంది.
- 4) హానికరమైన బాటీరియాపై దాడి చేసి వాటికీ ఆహారం లేకుండా చేసి తద్వారా వాటిని నిర్మాలిస్తుంది.

CLARION-VC

A Rational Blend of Multi Strain Probiotic
Fortified with ANTI-VIBRIO Harvey Strains



PRESENTATION : 1 Kg Pouch

COMPOSITION :

Total Potency	~ 15 billion CFU/gm
Bacillus Subtilis	5x10 ⁹ CFU/gm
Bacillus Licheniformis	5x10 ⁹ CFU/gm
Bacillus Megaterium	2.0x10 ⁹ CFU/gm
Bacillus Pumilus	2.0x10 ⁹ CFU/gm
Rhodococcus Spp	1.0x10 ⁹ CFU/gm
Enzyme Amylase	200000 IU/KG
Enzyme Protease	600000 IU/KG
Enzyme Cellulase	500000 IU/KG
Enzyme Xylanase	100000 IU/KG
Enzyme Lipase	150000 IU/KG
Rhodobacter Spp	
Nitrosomonas & Nitrobacter	
Excipients & Stabilizers	Q.S

BENEFITS :

- 1) Prevents Vibrio species and eliminates Luminous Bacteria (LB)
- 2) Reduces Ammonia Levels and Nitrogen compounds.
- 3) Improves production yield by 30%.
- 4) Converts undigested protein in excreta to useful FLOC which acts as natural feed
- 5) Reduces green colonies and yellow colonies in the pond water.

DOSAGE :

Fish/Shrimp: 500gm per acre. If green & yellow colonies are high (>40-50) apply 1kg in shrimp ponds For fish tanks monthly once. For shrimp ponds weekly once.

APPLICATION :


Take recommended quantity of Clarion-VC mix in 50 litres of water (for 500grams) for 10 minutes and apply all over the pond uniformly.

విశ్లేషణలు

- 1) చెరువు యొక్క అదుగు భాగంలో గల మురుగుడు మరియు బురదను తొలగిస్తుంది.
- 2) చెరువుకి అవసరమైన సుక్ష్మజీవాలు (useful bacteria) ప్రాథమిక అధికంగా ఉప్పటి చేస్తుంది.
- 3) విల్రియో బ్యాక్టీరియూ పల్ల వచ్చే గ్రీన్ కాలసీన్ ఎల్లో కాలసీన్ను తగ్గిస్తుంది.
- 4) హోమికరమైన బ్యాక్టీరియైపై దాడి చేసి వాటికీ ఆహారం లేవుండా చేసి తద్వారా వాటిని నిర్మాలిస్తుంది. వాతావరణ విపరీత పరిస్థితుల్లో నీది యొక్క pH అమోనియము దలగు వాటిని అదుపులో ఉంచుతుంది.

QBACTER

The Factor to Cure all Ammonia Problems



PRESENTATION : 1 litre HDPE Container

COMPOSITION :

An unique and proprietary rational blend of Ammonia absorbing species in Liquid form.

DOSAGE :

300-500ml per acre (5ft water depth)
Effective when used after the next day of the application of Zeotron Ultra (20kg/acre) & Trapex(500gm/acre)

APPLICATION :

Take recommended quantity of Q-Bacter mix in 50 litres of water (for 500ml) for 10 minutes and apply all over the pond uniformly.

BENEFITS :

- 1) Fast reduction of toxic gases like Ammonia, Hydrogen sulphide etc., in the pond environment
- 2) Effectively suppresses the Ammonia for a very long time.
- 3) Controls off odour and more efficient in Nitrogen cycle.
- 4) Increase of DO levels and makes the pond pollution free.
- 5) Assists in the breakdown of Organic flocks and undecomposed sludge.

విశ్లేషణలు

- 1) చెరువులో ఉన్న పొల్యాఫ్సీను మరియు అమ్మానియా గ్యాస్సును అత్యంత సమర్పంతంగా నిర్మలిస్తుంది.
- 2) దీనిలో ఉన్డె ప్రోబయాటీక్ అమ్మానియాను తీని పెరుగుతుంది తద్వారా చెరువులో అమ్మానియాను నిదానంగా (3 రోజుల్లో) తగ్గించి ఒక 20-30 రోజుల వరకు పెరగకుండా చూసుకుంటుంది.
- 3) నైట్రోజన్ సైకిల్లో అత్యంత ప్రభావశీలంగా పాల్చాని అమ్మానియాను తగ్గించి నైట్రోజన్ గ్యాస్సు గాలిలోకి పంపిస్తుంది.
- 4) చెరువు యొక్క అడుగు భాగంలో గల మురుగుడు మరియు బురదను తొలగిస్తుంది.

BIOWIN PRO

Feed Probiotic for Fish Culture



PRESENTATION : 10 Kg Bag

COMPOSITION :

Bacillus subtilis natto	400 million spores
Pediococcus acidilactici	400 million spores
Bacillus coagulans	400 million spores
Saccharomyces cerevisiae	400 million spores
Bacillus licheniformis	400 million spores
Bacillus megaterium	400 million spores
Bacillus polymyxa	400 million spores
Bacillus pumilus	400 million spores
Protease	600000 units
Amylase	200000 units
Lipase	150000 units
Cellulase	50000 units
Phytase	50000 FYT
Hemicellulase	20000 units
Xylanase	10000 units
Beta Mannanase	10000 units
Glucosidase	50000 units
Aluminium trioxide	47 gms
Calcium	75 gms
Silicon dioxide	600 gms
Carrier & Stabilisers	Q.S.

DOSAGE :

10kg per ton feed(Weekly twice)

APPLICATION : Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water. Spray all over the pond uniformly.

BENEFITS :

- 1) Arrest the growth of pathogenic bacteria in the fish gut.
- 2) Develops Better Skeletal and muscle strength.
- 3) Ensure healthy balance of digestive flora of fish.

విశ్లేషణలు

- 1) గట్లో గల హోనికారకమైన బాక్టీరియాలను అంతమొందిస్తుంది.
- 2) వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపాందిస్తుంది.
- 3) ఫిగ్యూంటేషన్ లోపాన్ని సరి చేసి చేపని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.
- 4) మేతలోని ప్రోటీన్సు సమర్థవంతంగా అరిగించుకుని అలోగ్యంగా ఉండేలా చూసుకుంటుంది.

EVERTONE MEGA

Fortified with ASTAXANTHIN



PRESENTATION : 1 kg Bag

COMPOSITION :

DL-Methionine (min)	2000mg
Folic Acid (min)	45mg
Lipase (min)	80IU
Bacillus Subtilis (min)	... 2,0 H 10 ⁹ CFU/g	
L-lyse (min)	4000mg
Vitamin E(min)	1800mg
Zinc (Zn)	2000-2500mg
Carrier : DCP	Q.S.

BENEFITS :

- 1) Improves Enzyme activity in gut. Improves both specific and non-specific immunity.
- 2) Greatly improves FCR and weight gains.
- 3) Improves feed efficiency, Organic Phosphorus utilization and fiber digestion due to yeasts.
- 4) Increases the nutrients uptake & protein digestibility there providing better skeletal and muscular strength
- 5) Suppresses the vibrio pathogens in the gut there by reducing the gut pH, intern reducing the white gut and white faecal dropping occurrences.

DOSAGE :

Shrimp: 10-20gm per kg of feed.
(Preferably in the last meal of the day)

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

విశ్లేషణలు

- 1) గట్లోని ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఇంకా పొపటోపాంక్రియాన్‌ని అరోగ్యంగా ఉండేలా చూసుకుంటుంది.
- 2) గుల్ల కొట్టు సమయిల్లో ఒత్తిడి వల్ల చావులను నివారిస్తుంది.
- 3) మేతలోని ప్రోటీన్ ను సమర్పించడంగా అరిగించుకుని రొయ్య అరోగ్యంగా ఉండేలా చేస్తుంది..
- 4) రొయ్య గట్లో చేరిన విటియో బాక్టీరియాను తొలగించి వైట్ గట్ ఇంకా వైట్ ఫికల్ మ్యాటర్ రానివ్వకుండా చూస్తుంది.

ECOSTRAIN-SP

Bio-Degrading Microbes



PRESENTATION : 10 kg, 15 kg HDPE Container

COMPOSITION :

Potency: 1kg	
Bacillus Subtilis	200 million CFU
Bacillus Licheniformis	200 million CFU
Bacillus Megaterium	200 million CFU
Bacillus Pumilus	200 million CFU
Rhodococcus Spp	400 million CFU
Paracoccus	400 million CFU
Peptone	0.05
Yucca	0.05
Excipients & Stabilizers	Q.S

BENEFITS :

- 1) It is rich in Probiotics naturally occurring bacteria, nutrients, micro and macro minerals which help in growth of phytoplankton and natural blooms.
- 2) It creates and maintain high water quality to create an ideal Environment for better growth of aquatic animals. Lowers FCR.
- 3) It is effective in wide range of salinity and pH.
- 4) Converts complex compounds to simple form for easy bio degradation.

DOSAGE : Fish/Shrimp: 2-3kg per acre.

For fish tanks monthly once.

For shrimp ponds weekly once.

APPLICATION : Take 1 kg Ecostrain-SP 1kg. Feed + 250gr. Jaggery + 50gr. Yeast + 5 Liters drinking water. Mix all the above and aerate with an Aquarium air pump for eight hours and broadcast morning between 9.00 am to 11.00 am

విల్కెప్ప లక్షణాలు

- 1) చెరువు యొక్క అడుగు భాగంలో గల మురుగుడు మరియు బురదను తొలగిస్తుంది.
- 2) చెరువులో ఉన్న పొల్చుపున్న మరియు అమ్మానియా గ్యాస్సును అణ్ణంత సమయంతంగా నిర్మాలిస్తుంది.
- 3) వాతావరణ విపరీత పరిస్థితుల్లో నేడి యొక్క pH అమ్మానియా ఆధ్యాజన్ లోపం మొదలగు వాటిని అదుపులో ఉంచుతుంది.
- 4) హనికరమైన బాక్టీరియాలై దాడి చేసి వాటికీ ఆహారం లేకుండా చేసి తద్వారా వాటిని నిర్మాలిస్తుంది.
- 5) చెరువుకి అవసరమైన సూక్ష్మజీవాలు (useful bacteria) ప్లాంక్టన్ అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- 6) విల్కెప్ప బాక్టీరియా వల్ల వచ్చే గ్రీన్ కాలసీన్ ను తగ్గిస్తుంది.



HYMOULT

Economic Water Softener



DOSAGE :

Fish & Shrimp : 1lt per acre (5feet water depth)
2 ltrs depth is above 5 feet
(or) as advised by aquaculture technician.

O₂ FLASH - T

Oxygen Tablets



DOSAGE : 1-2 kg per acre with 1 meter depth of water in 1-2 week intervals

Fish/Scampi Culture Pond : 1kg per acre with 1 meter depth of water in 3-4 week intervals.

O₂ FLASH G

Oxygen Granules



DOSAGE : 1-2 kg per acre with 1 meter depth of water in 1-2 week intervals

Fish/Scampi Culture Pond : 1kg per acre with 1 meter depth of water in 3-4 week intervals.

MENDER

The Unique Water Softener
and Detoxifier



PRESENTATION : 1 kg Pouch

COMPOSITION :

EDTA (ethylene diamine tetra acetic acid)	90%
Aluminium Silicate	2%
Ammonia reducing agents & Stabilisers	QS

DOSAGE :

Fish & Shrimp :
1lt per acre (5feet water depth)
2 ltrs depth is above 5 feet
(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity
and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

BENEFITS :


- 1) Efficiently removes the hardness and toxic substances from water and makes it very soft.
- 2) Creates healthy, toxic free environment for the growth of shrimp.
- 3) Helps in maintaining the stable bloom in pond water, very effective in all types of water systems like fresh water, saline water, canal water, bore-well water.

విశేష లక్షణాలు

- 1) రొయ్యల చెరువులలో హర్డ్ నెన్, నీటి సాందర్భ ఇంకా పొచ్చ మెటల్సును తొలగిస్తుంది.
- 2) చెరువులోని విష పదార్థాలను నిర్మిర్యం చేసి చేపలు, రొయ్యలు ఎదుగుదలకి చక్కబేచాలాన్ని సృష్టిస్తుంది.
- 3) రొయ్యలు త్వరగా గుల్ల విడిచేలా మళ్ళీ తిరిగి గుల్ల కట్టుకునేలా చూసుకుంటుంది.
- 4) రొయ్యల ఎదుగుదలకి అవసరమైన లవణాలను అందిస్తుంది.

ODOVANISH

Powerful Ammonia Reductant



PRESERATION : 500gm, 1KG HDPE Container

COMPOSITION :

Each 1kg contains
 Yucca Schidigera 300 gm, Boric Acid 300 gm
 Bacillus Subtilis 50 billion cfu,
 Bacillus Licheniformis 50 billion cfu,
 Bacillus Megaterium 50 billion cfu,
 Bacillus Polymyxa 50 billion cfu,
 Paracoccus 50 billion cfu,
 Silicon dioxide 200 gm,
 EDTA 100gm, Carriers & Stabilisers Q.S

BENEFITS :

- 1) Controls off odour and more efficient in nitrogen cycle.
- 2) Breaks down the organic flocks and uns-decomposed sludge
- 3) Fast reduction of toxic gases like ammonia, hydrogen sulphide and nitrite levels in pond.
- 4) Increases DO levels and makes the water pollution free.
- 5) Stabilises water parameters.

DOSAGE :

Effective when used along with Zeotron-Ultra(20kg/acre)
 (or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :


Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
 Spray all over the pond uniformly.

విశిష్ట లక్షణాలు

- 1) చెరువుల్లోని విష వాయుపులైన అమ్మానియా, సైంట్రోజన్ సల్వెడ్ వంటి వాటిని వేగవంతంగా నిర్మిస్తుంది.
- 2) సైట్రోజన్ సైకిల్లో అత్యంత ప్రభావశిలంగా పాల్టోని అమ్మానియాను తగ్గించి సైట్రోజన్ గ్యాస్‌గా గాలిలోకి వంపిస్తుంది.
- 3) చెరువులో ఉన్న పొల్యూషన్‌ను ఇంకా అడుగు భాగంలో గల బురదను అత్యంత సమర్పించి నిర్మిస్తుంది.
- 4) రౌయ్యలు, చేపలు వేగవంతంగా ఎదగడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.

TRAP-EX

Strong Gas Adsorber



PRESERNTATION : 500gm, 1KG HDPE Container

COMPOSITION : Each 1kg contains Yucca Schidigera 100 gm, Boric Acid 100 gm, Peptone 10gm, Bacillus subtilis 50 billion cfu, Bacillus Pumilus 50 billion cfu, Paracoccus 50 billion cfu, Rhodococcus 50 billion cfu, Silicon dioxide 300 gms, Carrier & Stabilisers Q.S., Protease 300000 units, Amylase 100000 units, Lipase 75000 units, Cellulase 25000 units, Phytase 25000 FYT, Hemicellulase 10000 units, Xylanase 5000 units, Beta Mannanase 5000 units, Glucosidase 25000 units

BENEFITS :

- 1) Minimizes the harmful ammonia in aqua pond atmosphere.
- 2) Enhances the water quality parameters
- 3) Clears the pond's bottom as well as helps in sludge clearance.
- 4) Breaks down organic flock and un-decomposed sludge
- 5) Boosts DO levels and makes water pollution free.

DOSAGE :

Effective when used along with Zeotron-Ultra(20kg/acre)

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water. Spray all over the pond uniformly.

విశిష్ట లక్షణాలు

- 1) చెరువలో ఉన్న పొలుయాషన్సు మరియు విష వాయువులైన అమోనియా, ప్రోడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వంటి వాచిని వేగవంతంగా నిర్మాలిస్తుంది.
- 2) నైట్రోజన్ నైకిలోర్ అత్యంత ప్రభావశిలంగా పాల్గొని అమోనియాను తగ్గించి నైట్రోజన్ గ్యాస్‌గా గాలిలోకి పంపిస్తుంది.
- 3) నైట్రోజన్, నైట్రోట్ వంటి హోనికరమైన వాయువులను నైట్రోజన్ గ్యాస్‌గా గాలిలోకి పంపిచేందుకు సహాయపడుతుంది.

ZEOTRON ULTRA

Natural Zeolite



PRESENTATION : 20KG Bag

COMPOSITION :

Silicon dioxide (SiO ₂)	5-70%
Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	15-27%
Calcium oxide (CaO)	3.0-8.0%
Magnesium Oxide (MgO)	0.5-3.0%
Sodium Oxide (NaO)	1.0-3.0%
Carrier : Hydrated Sodium Aluminium silicates (NaAlSi ₂ O ₆ ,H ₂ O)	QS

BENEFITS :

- 1) Improves Water Quality of Aquaculture Ponds.
- 2) NH₄⁺+(NH₃) ion absorption in freshwater environment.
- 3) Supplement minerals that stimulate algae growth in aquaculture pond water.
- 4) Absorbs Toxic Gases
- 5) Neutralizes the Pollution due to Heavy Metals
- 6) Controls Bad Odor from the Ponds.
- 7) Enhances the Dissolved Oxygen (DO) levels in the pond.

DOSAGE :

Effective when used along with Trapex/ Odovanish.
(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

విషప్త లక్షణాలు

- 1) చెరువలో ఉన్న విషపాయువులైన అమ్మానియూ, ప్రౌద్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇంకా అడుగు భాగంలో గల బురదను అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్మాలిస్తుంది.
- 2) నైట్రేట్, నైట్రోట్ వంటి హానికారకమైన వాయువులను వైట్రోజన్ గ్యాస్‌గా గాలిలోకి పంపించేందుకు సహాయపడుతుంది.
- 3) రొయ్యలు, చేపలు వేగవంతంగా ఎదగడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.
- 4) చెరువకి అవసరమైన సూక్ష్మజీవాలు (useful bacteria) ప్లాంక్టన్ అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

VICTRON-S

(Potassium mono persulphate) Triple Salt



PRESENTATION : 500gm, 1KG HDPE Container

COMPOSITION :

Potassium monosulphate (KHSO₅) : 45-50%
Sodium chloride (NaCl) : 45-50%

DOSAGE :

Fish & Shrimp :
1lt per acre (5feet water depth)
2 ltrs depth is above 5 feet
(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

BENEFITS :

- 1) Used as an Anti-bacterial, Virucidal and Fungicidal for ponds
- 2) Disinfection of water sources and tools for raising shrimp and fish
- 3) Effective control over a wide range of pathogens
- 4) It do not altere the other important water parameters like DO (Dissolved Oxygen)
- 5) Reduces Microbial Loads.

విశిష్ట లక్ష్యాలు

- 1) రొయ్యల చెరువులకు అత్యంత ప్రభావమైన ఇంకా రొయ్యకు ఎటువంటి హోనిచేయని వాటర్ కానిటైజర్.
- 2) రొయ్యల చెరువుల్లో హోనికరమైన వైరస్, బాక్టీరియాలను నిర్మాలిస్తుంది.
- 3) రొయ్యల్లో బాక్టీరియా వల్ల వచ్చే నల్ల మచ్చలు, తెల్ల మచ్చలు భూక్ & వైట్ గిల్, కాళ్ళ ఎరువు రంగులో రావడం వంటి వాటిని వేగవంతంగా నిర్మాలిస్తుంది.

BLUE MARK

Chelated Zinc



PRESENTATION : 1KG Pouch

COMPOSITION :

Zinc content (expressed as Zn), percent by weight minimum in the form of Zn EDTA- 8.25% w/w

BENEFITS :

- 1) Make the pond water rich with ZINC supplement.
- 2) Increases the transport of nutrients in pond water.
- 3) Creates pond water rich with minerals so that exoskeleton activites will be improved.
- 4) Participates in a wide range of bio chemical process.
- 5) Regulation of acid base equilibrium
- 6) Immunity enhancer, stress reliever and makes the animal disease resistance.

DOSAGE :

Fish & Shrimp :
1lt per acre (5feet water depth)
2 ltrs depth is above 5 feet
(or) as advised by aquaculture technician.

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water.
Spray all over the pond uniformly.

విల్చిష్ట లక్షణాలు

- 1) చెరువు నీటిలోను, మట్టిలోను జింక్ లోపాన్ని సరిచేస్తుంది.
- 2) చెరువుకి అవసరమైన సూక్ష్మజీవాలు (useful bacteria) పొంక్కన్ అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- 3) గట్లోని ఎంజైమ్ యూక్సీవిటీని మెరుగుపరుస్తుంది, శరీరంలో ఇతర జీవకియల్లో తనదైన పాతను పోషిస్తుంది.

PLANKTOBOOST

Planktobost



PRESENTATION : 10KG's Bag

COMPOSITION :

Calcium	36%
Phosphorous	12%
Magnesium Sulphate	200gm
Zinc Sulphate	200gm
Manganese Sulphate	50gm
Cobalt Sulphate	1000mg
Ammonium molybdate	500mg
Sodium Selenite	500mg
Bacillus Polymyxia	5 million cfu
Paracoccus	5 million cfu
Protease	300000 units
Amylase	100000 units
Lipase	75000 units
Cellulase	25000 units
Phytase	25000 FYT
Hemicellulase	10000 units
Xylanase	5000 units
Beta Mannanase	5000 units
Glucosidase	25000 units

DOSAGE :

Effective when used along with fertilisers like DAP, Urea, MOP

APPLICATION :

Take recommended quantity and mix in 30-40 Lt of water. Spray all over the pond uniformly.

BENEFITS :

- 1) Increases Pond fertility and soil productivity
- 2) Maintains stable water parameters and water quality.
- 3) Creates environment for the increase of dissolved oxygen in the pond.

విశ్లేషణలు

- 1) జింక, మాంగనిన్, కోబార్ట్, సెలీనియం మొదలగు 21 రకాలైన బ్రైన్ వినరల్స్‌ను చెరువుకి అందిస్తుంది. వీటి ద్వారా పైటో ప్లాంక్టన్ జూ ప్లాంక్టన్ అవసరమైసంత వరకు లభిస్తుంది.
- 2) రోటిఫోర్స్ కోపెపోడ్స్ మొదలగు జంతు జాతి సంబంధమైన రొయ్యలకు అవసరమైన ఆహారాన్ని పుట్టిస్తుంది.
- 3) చెరువు అడుగు భాగంలో గల వ్యర్థ పదార్థాలను ఘలవంతమైన ఎరువుగా తయారుచేస్తుంది.

General Protocols for Major Vetwin Formulations

Product	Conditions To Apply	Application Method, Dose and Time.
Trap-Ex	Whenever Ammonia/H2S levels above optimum.	Best to Mix in any Zeolite and Apply after 4pm. 500gm/Acre is the dosage. Or advised by Aqua technician.
	If tomorrow, is an application for Probiotic, applying Abolish today, will prepare the pond environment best for the action of probiotic.	Mix in sufficient sand and apply directly after 4.00 PM . 250-500 Gm/Acre is the dosage.or advised by Aqua Technician.
	Abolish is also best to give immediately after the application minerals in full moon/new moon days.	Best to Mix in any Zeolite and Apply after 4pm. 500gm/Acre is the dosage. Or advised by Aqua technician.
Mender	Before Molting Periods.	Apply between 10-11 am. 1KG/Acre. Mix in Sand apply.
	If hardness above >3000	Apply between 10-11 am. 1KG/Acre. Mix in Sand apply.
	If Heavy Metal Toxicity is High	Apply between 10-11 am. 1KG/Acre. Mix in Sand apply.
Bluespark 99	Whenever water is very transparent with almost no Turbidity. Can also be applied during Pond preparation.	9-10 am is the right time to apply. Just throw the water soluble pouches in front of the aerators. Don't cut the pouch. Dose 500gm/Acre. Or advised by Aqua technician.
D-300	Can be applied anytime, but more essential after molting. Necessary if pond blooming is less. Also essential for Magnesium Deficiency ponds.	Apply between 8am-9am. 20-40kg/Acre. Or advised by Aqua technician.
Minerva-P	Low Salinity (below 10ppt) Or after molting	Every week once, 10kg per Acre. At 9am. Mix in Sufficient water in boat/vessel and apply.
	B/w 10-20 ppt Or after molting	Every fortnight 10kg/Acre At 9am. Mix in Sufficient water in boat/vessel and apply.
	Above 20ppt Or after molting	Every 25 days dose 10kg/Acre At 9am. Mix in Sufficient water in boat/vessel and apply.
	Cramp Disease or Round Bendings of Shrimp	Double the Dose of Growmin as per the salinity. At 9am. Mix in Sufficient water in boat/vessel and apply. Or advised by the Aqua Consultant.
	Insufficient Growth Periods	Double the Dose of Growmin as per the salinity. At 9am Mix in Sufficient water in boat/vessel and apply. Or advised by the Aqua Consultant.
Minerva-F	In need of accelerated growths of Carp Fish & also for great fish color.	10kg/Ton of DOB Fish Feed regularly
Vinstar-C	Day 1 to Harvesting Day	In the morning 1st meal, Mix 10grams of Vinstar-C with 1Kg of Feed. Along with Binder Gel 30-
	Preventive Measure to reduce the attack of disease	50gms per Kg of Feed.
Acron-Gel	Use as Binder Gel for Shrimp Feed Pellets regularly or especially in the times of Low feed Intake	10-20 ml per Kg of Feed in the Every Meal.

Clarion-VC	If Green Colonies above 10	250-500 g./acre in water application, depending on the Vibrio loads. Apply at 7 am.
	As advanced preventive measure to Control Vibrio Pathogens	100gm/acre in water application, depending on the Vibrio loads. Apply at 7 am.
Evertone Mega	Daily in the Evening Meal	10 gm Per Kg of Feed along with Vetwin's Binder Gel(windol).
Ecostrain-SP Prolact-PS (apply alternatively)	During 1st Month	During Pond preparation, (before 3 days of PL stocking). Brew in 2KG Jaggery, 2KG Ground Nut Cake per Acre with 2-4Kg of Ecostrain-SP. Apply at 7am
	2nd Month	Apply Every 7 days at 7 am. Brew in 2KG Jaggery, 2KG Ground Nut Cake per Acre with 2-4Kg of Ecostrain-SP.
	3rd Month	Apply Every 4 days at 7 am. Brew in 2KG Jaggery, 2KG Ground Nut Cake per Acre with 2-4Kg of Ecostrain-SP.
Zeotron-Ultra	Apply before application of Probiotic	10-20kg/acre. After 4pm, Mix with Sand and Apply. Also mix Trap-Ex/Odovanish 250gm/acre in the mixture for extreme results.
	If Gases are generated like CO2, H2S, Ammonia	10-20kg/acre. After 4pm, Mix with Sand and Apply. Also mix Trap-Ex/Odovanish 250gm/acre in the mixture for extreme results.
	During Water Pollution at Weather Changes.	10-20kg/acre. After 4pm, Mix with Sand and Apply. Also mix Trap-Ex/Odovanish 250gm/acre in the mixture for extreme results.
Biogreen	Protozoal Fouling. Like Gums on Body/ Ciliated Infections.	1-2 lt per Acre. Mix in Water and apply at 9-10m
Killper-C	Fungal/Protozoal/Viral/Bacterial for Both Fish and Shrimp.	1-2 lt per Acre. Mix in Water and apply at 9-10m
Bluemark (chelated Zinc)	Zinc Deficient Ponds	Mix in Sand and Water and apply at 10am. Dose 1kg/Acre
Livosol	Advanced formulation for good Hepatopancreatic function	Every alternate week add in Feed. 10gm per Kg of Feed along with Vetwin's Binder Gel.
Odovanish	If Ammonia Levels are Very high.	Mix in sand and apply 250-500gm per Acre.
O2 Flash-G O2 Flash-T	Whenever DO falls below 4ppm.	Apply Night time 1kg/acre
	Also during Cloudy weather Conditions and Low pressure condition.	Apply Twice. Night 11pm and also Morning time 4-5am. Dose in 1kg/acre
Action-3D	Black Gill Disease	1-2 lt per Acre. Mix in Water and apply at 9-10m
	White Muscle Disease	1-2 lt per Acre. Mix in Water and apply at 9-10m
Victron-S	Whenever the Bacterial loads are High	Apply Victron-S/ Action-3D/ Killper-C/ Conqueror. Apply Morning 9-10 am in Sunny Conditions. Mix in Water and apply per 500gm of Victron-S
Q-Bacter	In High Intensive/Semi-Intensive Ponds where Ammonia levels beyond optimum.	1-3L per acre depending on the PL/Sqm. Mix in Water and Spread uniformly all over the pond at 9am.



13-38, Unit-1, Beside Lorry Owners
Association Petrol Bunk, NH16
Nidamanuru, Vijayawada,
Krishna District, A.P.INDIA - 521 104.
Contact No : + 91 91334 56111, 8328192910, 9542566669
www.vetwingroup.com, mail : kiran.vetwin@gmail.com

