

Acetazine Gotas

Tranquilizante



Caninos y Felinos
Venta bajo receta archivada
Uso veterinario

Contenido neto :10 mL

Fórmula:

Acetilpromazina (maleato) 1,00g, Excipientes c.s.p. 100 ml

Indicaciones de Uso:

Caninos y felinos. Indicado para tranquilizar animales agresivos o excitados, facilitando el manejo de los mismos, tanto para fines diagnósticos (métodos complementarios) como terapéuticos (tratamiento de heridas, drenaje de abscesos, etc.). Especialmente para los estudios radiológicos contrastados del aparato digestivo, porque no modifica la velocidad del tránsito gastrointestinal.

Como pre anestésico facilita la administración de los fármacos principales, asimismo disminuye su dosificación. Incrementa la actividad de los analgésicos y sedantes.

Formas de administración y posología:

Es un producto que se administra por vía oral ya sea solo o disuelto en agua. La dosificación debe ajustarse al grado de tranquilización requerida. La dosis en mg/kg disminuye a medida que aumenta el peso del animal.

Caninos: 0,5 a 2 mg/kg. 1 a 4 gotas por kilo

Felinos: 1 a 2mg/kg. 2 a 4 gotas por kilo

Como preanestésico se utiliza unos 10 – 20 minutos antes de anestesiarse y, de no lograr el efecto deseado entre los 15 – 20 minutos siguientes, aumentar gradualmente la dosis. El ayuno previo intensifica su acción.

De no observarse el efecto deseado a los 15 – 30 minutos de administrado, repetir la aplicación. Debe tomarse la precaución de utilizar la dosis más pequeña, dentro del intervalo para la especie. Como ejemplo de criterio: administrar 4 gotas/kgpv en la primera aplicación y 2 gotas/kgpv en los refuerzos.

Contraindicaciones:

Hembras lactantes y gestantes, epilepsia, animales en estado de shock o trauma post o con excitación emocional existente. No administrar junto a drogas hipotensoras, hidrocloreuro de procaína, o compuestos organofosforados. No administrar a cachorros menores de 6 meses.

Efectos secundarios:

Hipotensión, trombocitopenia; disfunción plaquetaria; protrusión de la membrana nictitante, ataxia, temblores musculares; hipotermia

Advertencias:

En sementales utilizar el rango de dosis más baja, puede provocar síncope en caninos razas braquiocefálicas; precaución en pacientes con insuficiencia renal, debilitados, anemia, enfermedades cardiovasculares viajar sobre todo cuando hace calor. Mantener fuera del alcance de los niños



Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160

Tel. +54 (011) 5430-5578 / 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA

Conservación :

Entre 5 y 25° C

Producto inscripto en SENASA

Cert. N°: 87526

Cnel. Uzal 3376 B1636DGF

Olivos, Buenos Aires



Elmer Argentina

Agreed Laboratorios S.A.- Dirección: Coronel Uzal 3376 (B1636),
Olivos, Buenos Aires, Argentina



Contáctenos:

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs-
Teléfonos:+54 11 5430-5578 o +54 11 5431-5782