

Acetazine Inyectable

Tranquilizante



Caninos, Felinos, Ovinos, Porcinos, Equinos y Bovinos

Venta bajo receta archivada

Uso en medicina veterinaria

Acción:

Este neuroléptico es selectivo del sistema nervioso central, en el que deprime el sistema límbico al interrumpir las conexiones, entre este y la formación reticular, generando un estado de quietud con disminución de la ansiedad, con lo que se facilita el manejo de los animales.

Si bien disminuye la actividad espontánea, a dosis medianas y pequeñas no induce el sueño, por ende, no hay pérdida de conciencia. Debe advertirse si, que ACETAZINE, incrementa la actividad de analgésicos, sedantes y anestésicos.

Indicaciones:

ACETAZINE está indicado para tranquilizar animales excitados o agresivos, facilita su manejo en las distintas intervenciones a las que deben ser sometidos, fines diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, transportes. Su uso en radiología, permite la correcta contención del paciente y, por su limitada acción sobre la mortalidad gastrointestinal, está indicado de modo especial, en los estudios seriados del tracto digestivo.

Fórmula:

Cada 100ml. contiene 1gr. de maleato de acetilpromazina. Se inyecta por vía intravenosa lenta, para evitar la hipotensión, intramuscular o subcutánea. La dosis se ajustará al grado de tranquilización deseado, teniendo en cuenta que en general, la proporción de maleato de acetilpromazina (mg/kg) disminuye a medida que aumenta el peso vivo del animal.

Las dosis sugeridas como tranquilizantes o pre anestésico son las siguientes:

EQUINOS Y BOVINOS: 5mg. cada 100kg. de peso vivo (0,5ml. de la solución).

OVINOS Y PORCINOS: 0,1 a 0,5 mg./kg de peso vivo (0,25ml. cada 10-15kg)

CANINOS: 0,5 a 1 mg/kg de peso vivo (1ml. cada 10-20 kg)

FELINOS: 1 a 2 mg/kg de peso vivo (1 ml. cada 5-10 kg.)

Como pre anestésico se utiliza 10-20 minutos antes de la anestesia y, de no lograr el efecto deseado en los 15-20 minutos siguientes, aumentar gradualmente la dosis.

Contraindicaciones:

Epilepsia, insuficiencia cardíaca, disfunciones hepáticas y mielo grafías (estudios radiológicos contrastados del sistema nervioso central).

Precauciones:



Utilizar con reservas en animales seniles. Evitar su utilización en terneros menores de 15 días y, en los sementales adultos puede ocurrir, ocasionalmente, el prolapso irreversible del pene, que deberá ser repuesto manualmente.

Por último no utilizar adrenalina como aminapresora en el animal medicado con Acetazine, por el contrario utilizar noradrenalina o fenilefrina.

Producto Inscripto en SENASA
Certificado N°87.527
Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 5430-5578/ 5431-5782
INDUSTRIA ARGENTINA



Elmer Argentina

Agreed Laboratorios S.A.- Dirección: Coronel Uzal 3376 (B1636),
Olivos, Buenos Aires, Argentina



Contáctenos:

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs-
Teléfonos: +54 11 5430-5578 o +54 11 5431-5782