

Elmer Pour On

Antiparasitario externo. Piojicida. Repelente de Insectos



Bovinos, Ovinos, y Porcinos
Uso en Medicina Veterinaria
Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario

Controla la Mosca del Cuerno
Contenido neto 1 lt/5 lt

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina (2,2-dimetil-3-(2,2 dicloro vinil) ciclo propil carboxilato de alfa ciano-3-fenoxibencilo) 5,00 g., Triclorfon 0,0 dimetil -(2, 2,2 tricloro-1-hidroxietil) fosfonato 10,00 g., Agentes de Formulación c.s.p 100,00 ml.

Indicaciones:

Para el control y tratamiento de la mosca del cuerno (*H. Irritans*) de piojos del género *Anoplura* (chupadores) en el bovino (*Haematopinus Eurysternus* y *Linognathus vituli*), en porcinos (*Haematopinus suis*) y en ovinos (*Linognathus Ovis* y *Pedalis*).

Asimismo, para los piojos del género *Mallophaga* (masticadores) en bovinos y ovinos (*Damalinea Bovis* y *Ovis*). Además, para el control y tratamiento de la garrapata espinosa de la oreja del bovino (*Otobius Meignini*). Como repelente de insectos: Moscas, *Stomoxys Calcitrans* (*Mosca Brava*), tábanos y mosquitos.

Dosificación:

- Para la Mosca del Cuerno y dípteros en general: 10 ml hasta 400 Kg de peso vivo y, 20 ml para más de 400 Kg de peso .
 - Para piojos en todas las especies: una dosis única de 10 ml para para bovinos y 5 ml para ovinos y porcinos.
 - Para la Garrapata de la Oreja: 1 ml en la cara interna de cada oreja.
- Como repelente de insectos, la dosis de 20 ml se distribuirá entre la cruz, la grupa y cada costillar.

Vías y Formas de Aplicación:

De aplicación directa, derramando el producto sobre la piel. Para piojos y mosca del cuerno, a lo largo de la línea media, desde la cruz hasta la grupa, agotando la dosis. Para la garrapata de la oreja, instilar la dosis en la parte interior del pabellón auricular y, como repelente de insectos distribuir en varios lugares.

Recomendaciones:

Agitar antes de usar. Es prudente evitar las horas de más calor o frío para efectuar el tratamiento, así como ante la amenaza de lluvia. En el lanar adulto, dosificar tras la esquila, dentro de los 45 días. En general, evitar impregnar demasiado los pelos y la lana y, en los cerdos, asegurar que la piel esté limpia.

Restricciones de Uso:

No faenar animales para consumo humano hasta pasados 21 días del último tratamiento. Sin restricción de uso para vacas lecheras en producción.

Precauciones:

Mantener el envase siempre bien cerrado, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evitar su contacto con productos alimenticios, bebidas y elementos para la higiene personal. En caso de contacto prolongado con la piel, lavar bien con agua y jabón. Destruir los envases tras el uso.

Aviso para el Médico:

En caso de ingestión accidental, llamar o acudir al médico, con el envase. Como este producto inhibe la colinesterasa corresponde el uso del sulfato de atropina al 1 por mil. Inyectar 3 mg con intervalos de 1-2 horas hasta desaparición de los síntomas de intoxicación. No suministrar morfina.



Advertencia:

Como este producto será utilizado fuera del control de su elaborador, éste no se responsabiliza por las consecuencias que surjan de su uso inadecuado.

Conservación:

Entre 5 y 25° C.

Mantener fuera del alcance de los niños
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Producto inscripto en SENASA
Certificado N° 92487
Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 5430-5578 / 5431-5782
INDUSTRIA ARGENTINA



Elmer Argentina

Agreed Laboratorios S.A.- Dirección: Coronel Uzal 3376 (B1636),
Olivos, Buenos Aires, Argentina



Contáctenos:

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs-
Teléfonos: +54 11 5430-5578 o +54 11 5431-5782