

Informe Técnico 015/20

HECTOPAR Spot FL

Pulgucida para gatos



Felinos de más de 4 kg.

Venta exclusiva en locales con asesoramiento profesional veterinario
Uso veterinario

Fórmula:

IMIDACLOPRID 10,00 g. 1-(2 cloro 5 piridimetil)-2-(nitroimino) Imidazolina.

AGENTES DE FORMULACIÓN C.S.P. 100 ml.

Presentación:

Pipeta plástica, contenido neto: 1,0 ml.

Indicaciones de Uso:

Para la prevención y tratamiento de las pulgas en el gato (Ctenocephalides spp.)

Formas de administración y dosis:

Con el animal parado, separar los pelos a la altura de la espalda hasta visualizar la piel. Apretar la pipeta y descargar el

total de la dosis en el lugar elegido. Cuidar el contacto con los ojos y la boca del animal. El pelaje debe estar seco.

Advertencia:

No utilizar en gatitos menores de 8 semanas (dos meses). En caso de que algún felino lamiera el lugar de la aplicación a lo sumo se observará una ligera salivación, que desaparece espontáneamente a los pocos minutos. El baño de higiene como la exposición prolongada a la lluvia puede limitar el periodo de protección, por lo que resulta prudente repetir el tratamiento. El 97% de las pulgas mueren dentro de las primeras 24 horas post-tratamiento y el 100 % en los días siguientes. La acción residual de HECTORPAR SPOT se estima en 30 días, por lo que el tratamiento deberá repetirse cada mes mientras perdure la infestación ambiental.

Precauciones:

Producto moderadamente tóxico. No sobre dosificar. Mantener en su envase original. Úsese con cuidado, peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel. No beber fumar o comer durante la dosificación. Luego de la aplicación, lavar las manos con agua y jabón. No almacenar junto a los productos para la alimentación y la higiene personal, guárdese bajo llave lejos de personas que no deben usarlo. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES. Tóxico para abejas y animales de sangre fría. No contaminar cursos de agua.

Toxicidad:

Síntomas: dolor de cabeza, estornudos, anestesia de labios y lengua, irritabilidad e incoordinación de movimientos, convulsiones. En caso de intoxicación accidental por el hombre llamar al médico o centros de intoxicaciones. Humanos: causa irritación y es peligrosa su ingestión. No contactar con ojos ni ropa, en caso de ocurrir, enjuagar los

ojos con abundante agua y, en caso de ingestión llamar al médico.

Antídoto: no se conoce antídoto alguno, se aconseja pues, el tratamiento sintomático atendiendo a que, en caso de ingestión accidental se sugiere provocar el vómito y llamar o acudir al médico con los elementos que permitan identificar el producto y su principal principio activo.

Centro Nacional de intoxicaciones
088-333-0160

Conservación:

Entre 15 y 25° C

Producto inscripto en SENASA

Cert. N°: 99.041

Cnel. Uzal 3376 B1636DGF





Olivos, Buenos Aires

Tel. +54 (011) 5430-5578 / 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA

Anexo I - Análisis comercial

Bravecto Gato grande: de 6,25 a 12,5 kg. Fluralaner 500 mg en pipeta de 1,79 ml.

Producto	Marca / Laboratorio	Fórmula	Presentación
	Feline Full Spot Labyes	Imidacloprid: 11 g Ivermectina: 0,2 g Praziquantel: 7,5 g Excip. c.s.p. 100 ml	Ectoendoparasiticida. Pipeta de 1,2 ml. Para gatos de más de 5 kg. Dura 30 días.
	Bravecto MSD	Fluralaner 280 mg c.s.p. 1 ml.	Pipeta spot on con 0,89 ml. (250 mg). Para gatos de 2,8 a 6,25 kg. Dura 3 meses para pulgas y garrapatas.
	La Pipeta Osspret	Imidacloprid 9,5 g. Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.	Pipeta con 1,0 ml. Para gatos de 4 a 8 kg.
	HECTOPAR F ELMER	Imidacloprid 10,00 g. Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.	Pipeta con 1,0 ml. Para gatos de más de 4 kg.