

Piperazina 100

Antiparasitario interno



Polvo soluble de uso oral

Uso en medicina veterinaria

Venta bajo receta

Fórmula:

Cada 10 gramos contiene: Diclorohidrato de piperazina 100 g.

Indicaciones:

Se trata de un vermífugo especialmente activo contra nemátodos que afectan a los animales domésticos según el siguiente espectro.

Equinos: Parascaris equorum, Oxyuris equi, especies de Trichonemas y parcialmente eficaz contra grandes y pequeños estróngilos.

Porcinos: Ascaris suum y esofagostomas (gusanos nodulares).

Aves: Ascaridia galli y parcialmente contra Heterakis gallinae (gusanos cecales).

Conejos: Passalurus ambiguss.

Perros y gatos: Toxocara canis, cati y Toxascaris leonina.

Dosis y vías de administración:

Equinos: 250 mg/kg de peso vivo (KgPV). No sobrepasar los 90 g (5g/20 kgPV), por sonda.

Porcinos: 200 mg/KgPV (5 g/25KgPV). No sobrepasar 60 g (5 g/25 KgPV). En agua de bebida 1,5 g/L, en la ración: 3g/kg de alimento.

Aves: menos de 6 semanas 200 g en el agua de bebida, 15g cada 10 litros de agua, en la ración: 25g cada 10 kg de alimento.

Conejos: 250 mg/KgPV (2,5 g cada 10 KgPV).

Perros y gatos: 100 mg/KgPV (2,5 g cada 25 KgPV).

Medidas de equivalencia practica de uso casero:

Una cucharadita de café al ras= 2,5g, de té al ras= 4 g, postre al ras= 9 g, sopa al ras=15 g.

El tratamiento podrá repetirse a los 18-21 días o, según criterio del médico veterinario. NO SOBREDOSIFICAR.

PIPERAZINA 100 puede ser administrado en el agua de bebida, en la ración húmeda o seca, por sonda naso-esofágica o simplemente con una botella provista de un trozo de manguera en su cuello. Es oportuno que el periodo de suministro voluntario sea lo más corto posible. Para ello es conveniente privar de la ración a los animales durante 12 hs, o cortarles el agua durante la noche. Se trata de un producto listo para usar. Será suficiente mezclarlo con el alimento o diluirlo con agua o leche. En los tratamientos colectivos procurar una buena homogenización. En caso de administrar el producto en raciones o agua de bebida, deberá ser administrado de inmediato.

Restricciones de uso:

Tiempo que debe transcurrir entre el último día de tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano: 10 días.

Tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento



y el destino de la leche o huevos o miel para consumo humano
(con o sin manufactura previa): 10 días.

Conservación: Ente 5 y 25° C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Producto inscripto en SENASA

Certificado N° 88.453

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF,

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA



Elmer Argentina

Agreed Laboratorios S.A.- Dirección: Coronel Uzal 3376 (B1636),
Olivos, Buenos Aires, Argentina



Contáctenos:

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs-
Teléfonos: +54 11 5430-5578 o +54 11 5431-5782