

Trautier

Analgésico, antiinflamatorio y antipirético.



Caninos y Felinos
Venta bajo receta
Uso en Medicina Veterinaria

Fórmula:

Cada comprimido contiene: Ácido acetilsalicílico 100mg.,
Papaína 20.000UI, excipientes C.S.P.

Acción:

En casi todos los sectores de la patología el dolor tiene categoría de protagonista, más aún, para el médico veterinario el dolor suele ser el único signo de enfermedad y, a menudo, el hilo conductor que los lleva a localizar la región o el órgano enfermo. Además, hay ocasiones que el dolor se suma a las lesiones que son su causa y que, por ende, es preciso sedar así como mitigar las manifestaciones inflamatorias y el estado febril, si este acompaña el proceso.

La aspirina inhibe el dolor mediante el bloqueo de las aminas responsables del estímulo doloroso, su acción antiinflamatoria por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas y, en cuanto a su condición de antipirético los es por depresión del centro termorregulador del hipotálamo.

En cuanto a la papaína, una enzima de la Carica Papaya, tiene reconocidas propiedades antiinflamatorias y resolutorias. Su acción es especialmente notable en el tratamiento de procesos flogísticos de origen traumático o con extravasaciones purulentas. Su asociación con el ácido acetil salicílico resulta

un excelente medio terapéutico para enfocar procesos inflamatorios en los pequeños animales.

Indicaciones:

En términos generales, TRAUTIER, como analgésico está especialmente indicado para sedar los dolores que nacen de las estructuras somáticas, músculos, tejidos, nervios, dientes, sin perjuicio del dolor visceral algo menos fluido por el uso de esta droga. Como antiflogístico en todas las inflamaciones del aparato musculo esquelético y, como antipirético en las hipertermias de cualquier origen, asociado o no con antibióticos. En el golpe de calor, insolación, en lo que es preciso remitir la temperatura corporal, resulta de ayuda. En lo particular está indicado en los procesos exudativos dolorosos, traumatismo musculo-esqueléticos, contusiones, hematomas, colectas, extracciones dentarias, tratamientos post quirúrgicos, intervenciones ginecológicas, esfuerzos musculares, desgarros, fracturas.

Vías de administración y dosis:

Por vía oral directamente o incluyendo el comprimido en algo de alimento.

Perros pequeños: ½ a 1 comprimido c/8 horas.

Perros medianos: 1 a 1 comprimidos c/ 6 – 8 horas.

Perros grandes: 2 a 3 comprimidos c/8 horas.

En cuanto a los gatos, es prudente no olvidar que en esta especie el metabolismo del ácido acetilsalicílico es especialmente lento, por lo que las dosis deben ser menores y a intervalos mayores para evitar ciertas intolerancias traducidas por apetito irregular, vómitos, tambaleos o reacciones de hipersensibilidad. En consecuencia, la dosis para los gatos es de 10 mg/5 kg de peso cada 48 horas (½ comprimido cada 5 kg).

Recomendación:

No utilizar simultáneamente con anticoagulantes. En caso de hipersensibilidad a algunas drogas, o diarreas, vómitos, suspender el tratamiento. Por lo que se refiere a modificaciones en la dosificación, frecuencia o duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario.



Conservación:

Entre 5° y 25 ° C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160

Producto inscripto en SENASA

Certificado N° 87236

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF,

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA



Elmer Argentina

Agreed Laboratorios S.A.- Dirección: Coronel Uzal 3376 (B1636),
Olivos, Buenos Aires, Argentina



Contáctenos:

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs-
Teléfonos: +54 11 5430-5578 o +54 11 5431-5782