

PRAZIQUANTEL

ANTIPARASITARIO INTERNO



PERROS Y GATOS

USO EN MEDICINA VETERINARIA

Cont. Neto: 4 Comp.

VENTA BAJO RECETA

FÓRMULA: Cada comprimido contiene: Praziquantel, 2-(cicloexil carbonil)-1,2,3,6,7,11b-hexahidro-4 H-pirazino (2,1-a) isoquinolin 4-ona 50mg., Levamisol, clorhidrato de 1,2,3,5,6-tetrahidrato 6- fenil-imidazol (2,1b) tiazol 100mg., Excipientes c.s.

ESPECTRO: (Formas maduras e inmaduras y huevos) Cestodes, *Dipylidium caninum* (perros y gatos), *Echinococcus granulosus* (perros y gatos), *Tenia hydatigena* (perros y gatos), *Tenia pisciformis*, *ovis*, *multiceps* y *serialis* (perros) y *Tenia taeniformis* (gatos), Nematodos; *Toxascaris leonina* (perros y gatos), *Toxocara canis* y *cati*, *Ancylostoma caninum* y *Uncinaria stenocephala* (perros), *Ancylostoma tubaeforme* (gatos).

FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Directamente sobre la cavidad bucal o mezclado y disimulado en el alimento, las dosis recomendadas son las siguientes:

- **Perros:** 1 comprimido cada 10 kg. de peso vivo (corresponde a 5 mg./kg de Praziquantel y 10 mg/kg. de Levamisol)
- **Gatos:** 1/2 comprimido cada 10 kg. de peso vivo o sus equivalencias (corresponde a 2,5 mg/kg. de Praziquantel y 5 mg/kg. de Levamisol).

RESTRICCIONES DE USO: No utilizar en cachorros y/o gatitos menores de 40 - 50 días. No sobredosificar. La intoxicación con Levamisol ocurre con dosis 4 veces superiores a la terapéutica. La aparición de los síntomas de intoxicación aparecen rápidamente, 15 minutos luego de su administración por vía oral y su recuperación es igualmente veloz, 1 a 6 horas.

- **Síntomas de intoxicación:** Inquietud, hipersalivación, vómito, cólico, diarrea. Bradicardia, disnea, taquipnea, también miosis, espasmos. No existe un tratamiento específico. Pueden usarse antagonistas de la nicotina como atropina. Es fundamental aportar oxígeno y eventualmente respiración artificial, para evitar el paro respiratorio.

Incompatibilidades: El levamisol antagoniza el efecto de Fenilbutazona. La Piperazina antagoniza el efecto del levamisol.

- **Contraindicaciones:** No administrar simultáneamente con Cloranfenicol, como así tampoco parasimpático miméticos como Pyrantel, Organofosforados, Carbamatos, Morantel y Neostigmina.

El levamisol potencia el efecto hipertensivo de Noradrenalina, Angiotensina y Acetilcolina. La piperazina antagoniza el efecto del Levamisol. Evitar la administración simultánea de drogas con acción nicotínica como Pirantel, Morantel y Dietilcarbamamacina porque reduce la DL50 del Levamisol.

CONSERVACIÓN: Mantener el producto entre 15 y 25° C.

Mantener fuera del alcance de los niños
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Agreed Laboratorios S.A. -

Cnel. Uzal 3376 (B1636DGF) Olivos, Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax (011) 5430-5578 / 5431-5782

senasa

Cert. N° 94.237 - Estab. Elab. N° 8248

Director Técnico: Dr.: Jorge Arena
Médico Veterinario, Mat. N° 5944

INDUSTRIA ARGENTINA