

दवा गाइड
फर्टिगेल 1%
(टेस्टोस्टेरोन ट्रांसडर्मल जेल) सामयिक उपयोग के लिए
(टेस-टीओएस-टीई-रॉन)

फर्टिगेल 1% के बारे में मुझे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या जाननी चाहिए

एक. फर्टिगेल 1% आपके शरीर से दूसरों में स्थानांतरित हो सकता है, जिनमें शामिल हैं,

बच्चे और महिलाएं। बच्चों और महिलाओं को बिना धुले या बिना ढके (बिना कपड़े के) क्षेत्रों के संपर्क से बचना चाहिए जहां आपकी त्वचा पर फर्टिगेल 1% लगाया गया है। यौवन के शुरुआती संकेत और लक्षण छोटे बच्चों में हुए हैं जो टेस्टोस्टेरोन के सीधे संपर्क में उन क्षेत्रों को छूकर आए हैं जहां पुरुषों ने फर्टिगेल 1% का उपयोग किया है।



बच्चे

एक बच्चे में प्रारंभिक यौवन के संकेत और लक्षण जब वे फर्टिगेल 1% के सीधे संपर्क में आते हैं शामिल हो सकते हैं:

असामान्य यौन परिवर्तन:

- बड़े हुए लिंग या भगशेफ।
- योनि के पास या लिंग (जघन बाल) के आसपास बालों का प्रारंभिक विकास।
- इरेक्शन या यौन आग्रह (सेक्स ड्राइव) का अभिनय करना।

व्यवहार की समस्याएं:

आक्रामक तरीके से कार्य करना, क्रोधित या हिंसक तरीके से व्यवहार करना।

महिलाओं

महिलाओं में संकेत और लक्षण जब वे फर्टिगेल 1% के सीधे संपर्क में आते हैं तो उनमें शामिल हो सकते हैं:

- शरीर के बालों में परिवर्तन।
- पिंपल्स (मुँहासे) में असामान्य वृद्धि।

फर्टिगेल 1% का उपयोग करना बंद कर दें और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को तुरंत कॉल करें यदि आपको किसी बच्चे या महिला में कोई संकेत और लक्षण दिखाई देते हैं जो उस क्षेत्र के आकस्मिक स्पर्श के माध्यम से हो सकता है जहां आपने फर्टिगेल 1% लगाया है।

दो. अपने शरीर से दूसरों को फर्टिगेल 1% के हस्तांतरण के जोखिम को कम करने के लिए, इन महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करें:


- फर्टिगेल 1% केवल अपने कंधों और ऊपरी बाहों पर लगाएं जो एक छोटी आस्तीन की टी-शर्ट द्वारा कवर किया जाएगा।
- फर्टिगेल 1% लगाने के बाद तुरंत अपने हाथों को साबुन और पानी से धो लें।
- जेल सूखने के बाद, आवेदन क्षेत्र को कपड़ों से ढक दें। क्षेत्र को तब तक ढक कर रखें जब तक कि आप आवेदन क्षेत्र को अच्छी तरह से धो न लें या स्नान न कर लें।
- यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क की उम्मीद करते हैं, तो पहले आवेदन क्षेत्र को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।

यदि कोई बच्चा या महिला उस क्षेत्र को छूती है जहां आपने फर्टिगेल 1% लगाया है, तो बच्चे या महिला पर उस क्षेत्र को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धोया जाना चाहिए।

Preparation Instructions






Wash your
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeve T-shirt.



**AVOID SKIN
CONTACT WITH
OTHERS**



**NO WATER
EXPOSURE**

फर्टिगेल 1% क्या है?

फर्टिगेल 1% एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। **फर्टिगेल 1%** का उपयोग उन वयस्क पुरुषों के इलाज के लिए किया जाता है जिनके पास कुछ चिकित्सीय स्थितियों के कारण कम या कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है।

- आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके शुरू करने से पहले और जब आप फर्टिगेल 1% का उपयोग कर रहे हों, तो आपके रक्त का परीक्षण करेगा।
- यह ज्ञात नहीं है कि उम्र बढ़ने के कारण कम टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों के इलाज के लिए फर्टिगेल 1% सुरक्षित या प्रभावी है या नहीं।
- यह ज्ञात नहीं है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फर्टिगेल 1% सुरक्षित या प्रभावी है या नहीं। फर्टिगेल 1% का अनुचित उपयोग बच्चों में हड्डियों के विकास को प्रभावित कर सकता है।

फर्टिगेल 1% एक नियंत्रित पदार्थ है क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है जो उन लोगों के लिए एक लक्ष्य हो सकता है जो चिकित्सकीय दवाओं का दुरुपयोग करते हैं। अपने FERTIGEL 1% को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। कभी भी अपने फर्टिगेल 1% को किसी और को न दें, भले ही उनके पास आपके समान लक्षण हों। इस दवा को बेचना या देना दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है और यह कानून के खिलाफ है।

फर्टिगेल 1% केवल पुरुषों के लिए है और महिलाओं द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

फर्टिगेल 1% का उपयोग न करें यदि आप:

- फर्टिगेल का उपयोग न करें 1% प्रोस्टेट कैंसर है या हो सकता है।
- गर्भवती हैं फर्टिगेल 1% आपके अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है।
- जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें त्वचा के उस क्षेत्र के संपर्क से बचना चाहिए जहां फर्टिगेल 1% लगाया गया है।

फर्टिगेल 1% का उपयोग करने से पहले, अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को अपनी सभी चिकित्सीय स्थितियों के बारे में बताएं, यदि आप:

- स्तन कैंसर है।
- प्रोस्टेट कैंसर है या हो सकता है।
- बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण मूत्र संबंधी समस्याएं हैं।
- दिल की समस्या है।
- किडनी या लिवर की समस्या है।
- सोते समय सांस लेने में समस्या होती है (स्लीप एपनिया)।

अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में बताएं, जिसमें डॉक्टर के पर्चे और ओवर-द-काउंटर दवाएं, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट शामिल हैं। कुछ अन्य दवाओं के साथ फर्टिगेल 1% का उपयोग एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से, अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं यदि आप लेते हैं:

- इनसुलिन
- दवाएं जो रक्त के थक्के को कम करती हैं (रक्त को पतला करने वाली) कोर्टिकोस्टेरॉइड्स

मुझे फर्टिगेल 1% का उपयोग कैसे करना चाहिए?

- इस दवा गाइड के अंत में फर्टिगेल 1% का उपयोग कैसे करें के बारे में उपयोग के लिए विस्तृत निर्देश देखें।
- यह महत्वपूर्ण है कि आप फर्टिगेल 1% को ठीक उसी तरह लागू करें जैसे आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको बताता है।
- आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी फर्टिगेल 1% खुराक बदल सकता है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात किए बिना अपनी फर्टिगेल 1% खुराक को न बदलें।

प्रत्येक सुबह एक ही समय में फर्टिगेल 1% लागू करें। फर्टिगेल 1% को स्नान या स्नान के बाद लागू किया जाना चाहिए।

फर्टिगेल 1% के संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं?

फर्टिगेल 1% सहित गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है:

देखें "फर्टिगेल 1% के बारे में मुझे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या जाननी चाहिए?"

- यदि आपके पास पहले से ही आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि का इज़ाफ़ा है, तो फर्टिगेल 1% का उपयोग करते समय आपके संकेत और लक्षण खराब हो सकते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- रात में पेशाब में वृद्धि।
- अपने मूत्र प्रवाह शुरू करने में परेशानी।
- दिन में कई बार पेशाब करना पड़ता है।
- तुरंत बाथरूम जाने की इच्छा होना।
- मूत्र दुर्घटना होना।
- मूत्र पारित करने में असमर्थ या कमजोर मूत्र प्रवाह।
- **प्रोस्टेट कैंसर का संभावित खतरा बढ़ जाता है।** आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपको शुरू करने से पहले प्रोस्टेट कैंसर या किसी अन्य प्रोस्टेट समस्याओं के लिए जांच करनी चाहिए और जब आप फर्टिगेल 1% का उपयोग करते हैं।
- **पैरों या फेफड़ों में रक्त के थक्के।** आपके पैर में रक्त के थक्के के संकेत और लक्षणों में पैर दर्द, सूजन या लालिमा शामिल हो सकते हैं। आपके फेफड़ों में रक्त के थक्के के संकेत और लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई या सीने में दर्द शामिल हो सकते हैं।
- **दिल का दौरा या स्ट्रोक का संभावित खतरा बढ़ जाता है।**
- **बड़ी खुराक में फर्टिगेल 1% आपके शुक्राणुओं की संख्या को कम कर सकता है।**
- **दिल की विफलता के साथ या बिना आपके टखनों, पैरों या शरीर की सूजन।**
- **बढ़े हुए या दर्दनाक स्तन।**
- **सोते समय सांस लेने में समस्या होती है (स्लीप एपनिया)।**

अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को तुरंत कॉल करें यदि आपके पास ऊपर सूचीबद्ध कोई भी गंभीर दुष्प्रभाव है।

फर्टिगेल 1% के सबसे आम दुष्प्रभावों में शामिल हैं:

- बढ़ी हुई प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन (प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परीक्षण)
- मूड स्विंग्स
- उच्च रक्तचाप
- लाल रक्त कोशिका की संख्या में वृद्धि
- त्वचा की जलन जहां फर्टिगेल 1% लागू किया जाता है

अन्य दुष्प्रभावों में आपके लिए सामान्य से अधिक इरेक्शन या लंबे समय तक चलने वाले इरेक्शन शामिल हैं। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं कि क्या आपके पास कोई दुष्प्रभाव है जो आपको परेशान करता है या जो दूर नहीं जाता है।

ये फर्टिगेल 1% के सभी संभावित दुष्प्रभाव नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या फार्मासिस्ट से पूछें।

FERTIGEL 1% के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के बारे में सामान्य जानकारी

दवाएं कभी-कभी दवा गाइड में सूचीबद्ध उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित की जाती हैं। फर्टिगेल 1% का उपयोग उस शर्त के लिए न करें जिसके लिए यह निर्धारित नहीं किया गया था। अन्य लोगों को 1% फर्टिगेल न करें, भले ही उनके पास आपके समान लक्षण हों। इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। आप जानकारी के लिए अपने फार्मासिस्ट या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछ सकते हैं FERTIGEL 1% के बारे में जो स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए लिखा गया है।

फर्टिगेल 1% में तत्व क्या हैं?

सक्रिय घटक: टेस्टोस्टेरोन Undecanoate (5mg ट्यूब में जेल बेस में 50 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन होता है)

निष्क्रिय तत्व: जेल बेस q.s.



द्वारा विपणन किया गया: फर्टिलमेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 1/28 मेनरोड, मुलंगुडी पोस्ट, कोडवासल तालुक, तिरुवरूर जिला, तमिलनाडु, भारत 612610।
मेल आईडी : fertigel@fertillmed.com. वेबसाइट : www.fertillmed.com/fertigel



यहां स्कैन करें
इसके बारे में अधिक जानने के लिए
फर्टिगेल 1%।