

ਦਵਾਈ ਗਾਈਡ
FERTIGEL 1%
(ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਡਰਮਲ ਜੈਲ) ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
(tes-TOS-te-ron)

ਫਰਟੀਗਲ 1% ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

1. FERTIGEL 1% ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਧੋਤੇ ਜਾਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ (ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ FERTIGEL 1% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।



ਬੱਚੇ

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਜਦੋਂ ਉਹ FERTIGEL ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 1% ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਅਸਧਾਰਨ ਜਿਨਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

- ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲਿਟੋਰਿਸ।
- ਯੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ (ਪਿਊਬਿਕ ਵਾਲ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ।
- ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ (ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ) ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ।

ਔਰਤਾਂ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਜਦੋਂ ਉਹ FERTIGEL 1% ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।
- ਮੁਹਾਸੇ (ਮੁਹਾਸੇ) ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ।

FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ FERTIGEL 1% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ FERTIGEL 1% ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


- ਫਰਟੀਗਲ 1% ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਹ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਫਰਟੀਗਲ 1% ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
- ਜੇਲ ਸ਼ੱਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ FERTIGEL 1% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤ 'ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Preparation Instructions






Wash your
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeved T-shirt.



AVOID SKIN
CONTACT WITH
OTHERS



NO WATER
EXPOSURE

ਫਰਟੀਗਲ 1% ਕੀ ਹੈ?

ਫਰਟੀਗਲ 1% ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। **ਫਰਟੀਗਲ 1%** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
- ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਰਟੀਗਲ 1% ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ FERTIGEL 1% 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। FERTIGEL 1% ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਰਟੀਗਲ 1% ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਟੀਗਲ 1% ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ FERTIGEL ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

*** ਫਰਟੀਗਲ 1% ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।**

FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

- FERTIGEL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ 1% ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ FERTIGEL 1% ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ FERTIGEL 1% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ:

- ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
- ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
- ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ)।

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਗਲ 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ:

- ਇਨਸੁਲਿਨ
- ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼

ਮੈਨੂੰ FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

- ਇਸ ਦਵਾਈ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋ।
- ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FERTIGEL 1% ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ FERTIGEL 1% ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ FERTIGEL 1% ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ।

ਹਰ ਸਵੇਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ FERTIGEL 1% ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਗਲ 1% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

FERTIGEL 1% ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹਨ?

FERTIGEL 1% ਗੰਭੀਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਦੇਖੋ "ਫਰਟੀਗਲ 1% ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?"

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤਾਂ FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।
- ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਰੰਤ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ।
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ।
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਹ।
- ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, FERTIGEL 1% ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ, ਪੈਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਜ।
- ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਛਾਤੀਆਂ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

FERTIGEL 1% ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜਨ (ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ)
- ਮੂਤਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
- ਗਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ
- ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਜਿੱਥੇ ਫਰਟੀਗਲ 1% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਥਾਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ FERTIGEL 1% ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

FERTIGEL ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 1%

ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। FERTIGEL 1% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1% ਨਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਟੀਗਲ 1% ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

FERTIGEL 1% ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ?

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ: ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਅਨਡੋਕੈਨੋਏਟ (5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਜੈੱਲ ਬੇਸ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ: ਜੈੱਲ ਬੇਸ ਕਿਊਐਸ।



ਫਰਟੀਲਮੇਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, 1/28 ਮੇਨਰੋਡ, ਮੁਲਾਨਗੁਡੀ ਪੋਸਟ, ਕੋਡਾਵਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਤਿਰੂਵਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਭਾਰਤ 612610 ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਲ ਆਈਡੀ : fertigel@fertillmed.com. ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.fertillmed.com/fertigel



ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਫਰਟੀਗਲ 1%