

மருந்து கையேடு

ஃபெர்டிஜெல் 1%

(டெஸ்டோஸ்டிரோன் டிரான்ஸ்டெர்மல் ஜெல்) மேற்பூச்சு பயன்பாட்டிற்கு
(டெஸ்-டோஸ்-டெ-ரான்)

ஃபெர்டிஜெல் 1% பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான தகவல் என்ன

1. ஃபெர்டிஜெல் 1% உங்கள் உடலில் இருந்து மற்றவர்களுக்கு மாற்றப்படலாம்,

குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள். குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் உங்கள் தோலில் ஃபெர்டிஜெல் 1% பூசப்பட்ட கழுவப்படாத அல்லது மூடப்படாத (ஆடையற்ற) பகுதிகளைத் தொடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். பருவமடைதலின் ஆரம்ப அறிகுறிகளும் அறிகுறிகளும் ஆண்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% பயன்படுத்திய பகுதிகளைத் தொடுவதன் மூலம் டெஸ்டோஸ்டிரோனுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்ட இளம் குழந்தைகளில் ஏற்பட்டுள்ளன.



குழந்தைகள்

ஃபெர்டிஜெல் 1% உடன் நேரடி தொடர்பு கொள்ளும்போது ஒரு குழந்தை ஆரம்ப பருவமடைதலின் அறிகுறிகள்

இதில் அடங்குபவை:

அசாதாரண பாலியல் மாற்றங்கள்:

- விரிவாக்கப்பட்ட ஆண்குறி அல்லது பெண்குறிமூலம்.
- யோனிக்கு அருகில் அல்லது ஆண்குறியை சுற்றி (அந்தரங்க முடி) ஆரம்ப முடி வளர்ச்சி.
- விறைப்புத்தன்மை அல்லது பாலியல் தூண்டுதல்களை நடிப்பது (செக்ஸ் டிரைவ்).

நடத்தை சிக்கல்கள்:

ஆக்ரோஷமாக செயல்படுதல், கோபமாக அல்லது வன்முறையான முறையில் நடந்து கொள்ளுதல்.

மகளிர்

ஃபெர்டிஜெல் 1% உடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும்போது பெண்களில் ஏற்படும் அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

- உடல் முடிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.
- பருக்கள் (முகப்பரு) அசாதாரண அதிகரிப்பு.

ஃபெர்டிஜெல் 1% பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு, நீங்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% ஐப் பயன்படுத்திய பகுதியை தற்செயலாகத் தொடுவதன் மூலம் ஒரு குழந்தை அல்லது பெண்ணில் ஏதேனும் அறிகுறிகளைக் கண்டால் உடனடியாக உங்கள் சுகாதார வழங்குநரை அழைக்கவும்.

2. உங்கள் உடலில் இருந்து ஃபெர்டிஜெல் 1% மற்றவர்களுக்கு மாற்றப்படும்

அபாயத்தைக் குறைக்க, இந்த முக்கியமான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:

- ஃபெர்டிஜெல் 1% ஐ உங்கள் தோள்பட்டை மற்றும் மேல் கைகளில் மட்டும் தடவவும், இது ஒரு குறுகிய ஸ்லீவ் டி-ஷர்ட்டால் மூடப்பட்டிருக்கும்.


- ஃபெர்டிஜெல் 1% தடவிய பிறகு உடனடியாக உங்கள் கைகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும்.
- ஜெல் காய்ந்த பிறகு, பயன்பாட்டு பகுதியை ஆடையுடன் மூடி வைக்கவும். நீங்கள் பயன்பாட்டு பகுதியை நன்கு கழுவிய வரை அல்லது குளிக்கும் வரை அந்த பகுதியை மூடி வைக்கவும்.
- வேறொரு நபருடன் தோல்-க்கு-தோல் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தால், முதலில் பயன்பாட்டு பகுதியை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கழுவவும்.

ஒரு குழந்தை அல்லது பெண் நீங்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% பயன்படுத்திய பகுதியைத் தொட்டால், அந்த பகுதியை குழந்தை அல்லது பெண்ணுக்கு உடனடியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கழுவ வேண்டும்.

Preparation Instructions






Wash your
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeve T-shirt.



AVOID SKIN CONTACT WITH OTHERS



NO WATER EXPOSURE

ஃபெர்டிஜெல் 1% என்றால் என்ன?

ஃபெர்டிஜெல் 1% என்பது டெஸ்டோஸ்டிரோன் கொண்டிருக்கும் ஒரு மருந்து மருந்து. ஃபெர்டிஜெல் 1% சில மருத்துவ நிலைமைகள் காரணமாக குறைந்த அல்லது டெஸ்டோஸ்டிரோன் இல்லாத வயது வந்த ஆண்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது.

- நீங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பும், நீங்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% ஐப் பயன்படுத்தும்போதும் உங்கள் சுகாதார வழங்குநர் உங்கள் இரத்தத்தை பரிசோதிப்பார்.
- வயதான காரணமாக குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் கொண்ட ஆண்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க ஃபெர்டிஜெல் 1% பாதுகாப்பானதா அல்லது பயனுள்ளதா என்பது தெரியவில்லை.
- 18 வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகளில் ஃபெர்டிஜெல் 1% பாதுகாப்பானதா அல்லது பயனுள்ளதா என்பது தெரியவில்லை. ஃபெர்டிஜெல் 1% முறையற்ற பயன்பாடு குழந்தைகளில் எலும்பு வளர்ச்சியை பாதிக்கலாம்.

ஃபெர்டிஜெல் 1% ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருளாகும், ஏனெனில் இது டெஸ்டோஸ்டிரோனைக் கொண்டுள்ளது, இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகளை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் மக்களுக்கு இலக்காக இருக்கலாம். உங்கள் FERTIGEL 1% ஐப் பாதுகாக்க பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% ஐ வேறு யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம், உங்களிடம் உள்ள அதே அறிகுறிகள் இருந்தாலும் கூட. இந்த மருந்தை விற்பது அல்லது கொடுப்பது மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் சட்டத்திற்கு எதிரானது.

* ஃபெர்டிஜெல் 1% ஆண்களுக்கு மட்டுமே, பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது.

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் ஃபெர்டிஜெல் 1% பயன்படுத்த வேண்டாம்:

- ஃபெர்டிஜெல் பயன்படுத்த வேண்டாம் 1% புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் உள்ளது அல்லது இருக்கலாம்.
- கர்ப்பமாக இருந்தால் ஃபெர்டிஜெல் 1% உங்கள் வயிற்றில் உள்ள குழந்தைக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
- கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% பயன்படுத்தப்பட்ட தோலின் பகுதியுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

ஃபெர்டிஜெல் 1% ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, உங்கள் அனைத்து மருத்துவ நிலைமைகளையும் பற்றி உங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் சொல்லுங்கள்:

- மார்பக புற்றுநோய் உள்ளது.
- புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் உள்ளது அல்லது இருக்கலாம்.
- புரோஸ்டேட் விரிவாக்கம் காரணமாக சிறுநீர் பிரச்சினைகள் உள்ளன.
- இதய பிரச்சினைகள் உள்ளன.
- சிறுநீரகம் அல்லது கல்லீரல் பிரச்சினைகள் இருந்தால்.

- நீங்கள் தூங்கும்போது சுவாசிப்பதில் பிரச்சனைகள் உள்ளன (தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல்).

பரிந்துரைக்கப்பட்ட மற்றும் மேலதிக மருந்துகள், வைட்டமின்கள் மற்றும் மூலிகை மருந்துகள் உட்பட நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து மருந்துகளையும் பற்றி உங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் சொல்லுங்கள். ஃபெர்டிஜெல் 1% மருந்தை வேறு சில மருந்துகளுடன் பயன்படுத்துவது ஒருவருக்கொருவர் பாதிக்கலாம்.

குறிப்பாக, நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டால் உங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் சொல்லுங்கள்:

- இன்சலின்
- இரத்த உறைதலைக் குறைக்கும் மருந்துகள் (இரத்த மெலிந்தவை) கார்டிகோஸ்டிராய்டுகள்

FERTIGEL 1% ஐ நான் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

- இந்த மருந்து வழிகாட்டியின் முடிவில் FERTIGEL 1% ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய பயன்பாட்டிற்கான விரிவான வழிமுறைகளைப் பார்க்கவும் .
- உங்கள் சுகாதார வழங்குநர் உங்களுக்குச் சொல்வது போலவே ஃபெர்டிஜெல் 1% ஐப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
- உங்கள் சுகாதார வழங்குநர் உங்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% அளவை மாற்றலாம். உங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் பேசாமல் உங்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% அளவை மாற்ற வேண்டாம்.

தினமும் காலையில் ஒரே நேரத்தில் ஃபெர்டிஜெல் 1% தடவவும். ஃபெர்டிஜெல் 1% குளித்த பிறகு அல்லது குளித்த பிறகு பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஃபெர்டிஜெல் 1% இன் சாத்தியமான பக்க விளைவுகள் என்ன?

ஃபெர்டிஜெல் 1% கடுமையான பக்க விளைவுகளை

ஏற்படுத்தும், அவற்றுள்:

"ஃபெர்டிஜெல் 1% பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான தகவல் என்ன?" என்பதைப் பார்க்கவும்.

- உங்களுக்கு ஏற்கனவே புரோஸ்டேட் சுரப்பியின் விரிவாக்கம் இருந்தால், ஃபெர்டிஜெல் 1% பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அறிகுறிகள் மோசமடையக்கூடும். இதில் அடங்குபவை:
 - இரவில் அதிகமாக சிறுநீர் கழித்தல்.
 - உங்கள் சிறுநீர் ஓட்டத்தைத் தொடங்குவதில் சிக்கல்.
 - பகலில் பலமுறை சிறுநீர் கழிக்க வேண்டியிருத்தல்.
 - உடனடியாக குளியலறைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற உந்துதல்.
 - சிறுநீர் விபத்து ஏற்படுதல்.
 - சிறுநீர் கழிக்க இயலாமை அல்லது சிறுநீர் வெளியேறுவது பலவீனமாக இருத்தல்.
- புரோஸ்டேட் புற்றுநோயின் சாத்தியமான ஆபத்து அதிகரித்துள்ளது. நீங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பும், நீங்கள் ஃபெர்டிஜெல் 1% ஐப் பயன்படுத்தும்போதும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் அல்லது வேறு ஏதேனும் புரோஸ்டேட் பிரச்சினைகளுக்கு உங்கள் சுகாதார வழங்குநர் உங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
- கால்கள் அல்லது நுரையீரலில் இரத்த உறைவு. உங்கள் காலில் இரத்த உறைவின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகளில் கால் வலி, வீக்கம் அல்லது சிவத்தல் ஆகியவை அடங்கும். உங்கள் நுரையீரலில் இரத்த உறைவின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகளில் சுவாசிப்பதில் சிரமம் அல்லது மார்பு வலி ஆகியவை அடங்கும்.
- மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படும் சாத்தியம் அதிகரித்துள்ளது.
- பெரிய அளவுகளில், ஃபெர்டிஜெல் 1% உங்கள் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கலாம்.
- இதய செயலிழப்புடன் அல்லது இல்லாமல் உங்கள் கணுக்கால், பாதங்கள் அல்லது உடலில் வீக்கம்.
- பெரிதான அல்லது வலிமிகுந்த மார்பகங்கள்.
- நீங்கள் தூங்கும்போது சுவாசிப்பதில் பிரச்சனைகள் உள்ளன (தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல்).

மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள கடுமையான பக்க விளைவுகள் ஏதேனும்

இருந்தால் உடனே உங்கள் சுகாதார வழங்குநரை அழைக்கவும். ஃபெர்டிஜெல்

1% இன் மிகவும் பொதுவான பக்க விளைவுகள் பின்வருமாறு:

- அதிகரித்த புரோஸ்டேட் குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜென் (புரோஸ்டேட் புற்றுநோயைத் திரையிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சோதனை).
- மனநிலை மாற்றங்கள்
- உயர் இரத்த அழுத்தம்
- அதிகரித்த இரத்த சிவப்பணு எண்ணிக்கை
- ஃபெர்டிஜெல் 1% பயன்படுத்தப்படும் இடத்தில் தோல் எரிச்சல்

பிற பக்க விளைவுகளில் உங்களுக்கு இயல்பானதை விட அதிக

விறைப்புத்தன்மை அல்லது நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் விறைப்புத்தன்மை ஆகியவை

அடங்கும். உங்களைத் தொந்தரவு செய்யும் அல்லது போகாத ஏதேனும் பக்க

விளைவு இருந்தால் உங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் சொல்லுங்கள்.

இவை அனைத்தும் ஃபெர்டிஜெல் 1% இன் சாத்தியமான பக்க விளைவுகள் அல்ல.மேலும் தகவலுக்கு, உங்கள் சுகாதார வழங்குநர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேளுங்கள்.

ஃபெர்டிஜெல் 1% இன் பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள பயன்பாடு பற்றிய பொதுவான தகவல்கள்

மருந்துகள் வழிகாட்டியில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களைத் தவிர வேறு நோக்கங்களுக்காக மருந்துகள் சில நேரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. ஃபெர்டிஜெல் 1% பரிந்துரைக்கப்படாத ஒரு நிலைக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம். உங்களிடம் உள்ள அதே அறிகுறிகள் இருந்தாலும் கூட, மற்றவர்களுக்கு 1% ஃபெர்டிஜெல் வேண்டாம். அது அவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கலாம். உங்கள் மருந்தாளர் அல்லது சுகாதார வழங்குநரிடம் தகவலைக் கேட்கலாம் FERTIGEL பற்றி 1% இது சுகாதார நிபுணர்களுக்காக எழுதப்பட்டது.

ஃபெர்டிஜெல் 1% இல் உள்ள பொருட்கள்

என்னென்ன?

செயலில் உள்ள மூலப்பொருள்: டெஸ்டோஸ்டிரோன் Undecanoate (5mg குழாய் ஜெல்

அடிப்படை டெஸ்டோஸ்டிரோன் 50 மிகி கொண்டுள்ளது)

செயலற்ற பொருட்கள்: ஜெல் பேஸ் கியூ.எஸ்.



சந்தைப்படுத்தியது: ஃபெர்டிஜெல்மெட் பார்மாகூட்டிகல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், 1/28 மெயின்ரோடு, முள்ளங்குடி அஞ்சல், குடவாசல் தாலுகா, திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு, இந்தியா 612610.

மின்னஞ்சல் : fertigel@fertillmed.com. இணையதளம் : www.fertillmed.com/fertigel



இங்கே ஸ்கேன் செய்யவும்
பற்றி மேலும் அறிய
பெர்டிஜெல் 1%.