

**ఔషధ గైడ్**

**FERTIGEL 1%**

సమయోచిత ఉపయోగం కోసం (టెస్టోస్టెరాన్ ట్రాన్సెన్సార్మల్ జెల్)  
(tes-TOS-te-ron)

**ఫెర్టిజెల్ 1% గురించి నేను తెలుసుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన సమాచారం ఏమిటి?**

**1. ఫెర్టిజెల్ 1% మీ శరీరం నుండి ఇతరులకు బదిలీ చేయగలదు, వీటిలో,**

**పిల్లలు, మహిళలు..** పిల్లలు మరియు మహిళలు మీ చర్మానికి ఫెర్టిజెల్ 1% వర్తించే కడగని లేదా కవర్ చేయని (దుస్తులు లేని) ప్రాంతాలతో సంబంధాన్ని నివారించాలి. పురుషులు ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగించిన ప్రాంతాలను తాకడం ద్వారా టెస్టోస్టెరాన్ ప్రత్యక్ష సంబంధంలోకి వచ్చిన చిన్న పిల్లలలో యుక్తవయస్సు యొక్క ప్రారంభ సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు సంభవించాయి.



**పిల్లలు**

ఫెర్టిజెల్ 1% తో ప్రత్యక్ష సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు పిల్లలలో ప్రారంభ యుక్తవయస్సు యొక్క సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు

వీటిలో ఇవి ఉండవచ్చు:

**అసాధారణ లైంగిక మార్పులు:**

- విస్తరించిన పురుషాంగం లేదా క్లిటోరిస్.
- యోని దగ్గర లేదా పురుషాంగం చుట్టూ (జఘన జాట్లు) జాట్లు యొక్క ప్రారంభ పెరుగుదల.
- అంగస్తంభన లేదా లైంగిక కోరికలను ప్రదర్శించడం (సెక్స్ డ్రైవ్).

**ప్రవర్తనా సమస్యలు:**

దూకుడుగా వ్యవహరించడం, కోపంగా లేదా హింసాత్మకంగా ప్రవర్తించడం.

**స్త్రీలు**

ఫెర్టిజెల్ 1% తో ప్రత్యక్ష సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు మహిళల్లో సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు వీటిలో ఉండవచ్చు:

- శరీర వెంట్రుకల్లో మార్పులు..
- మొటిమలు (మొటిమలు) అసాధారణంగా పెరగడం.

ఫెర్టిజెల్ 1% వాడటం ఆపండి మరియు మీరు ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగించిన ప్రాంతాన్ని ప్రమాదవశాత్తు తాకడం ద్వారా సంభవించిన పిల్లవాడు లేదా మహిళలో ఏవైనా సంకేతాలు మరియు లక్షణాలను మీరు గమనించినట్లయితే వెంటనే మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతకు కాల్ చేయండి.

**2. మీ శరీరం నుండి ఇతరులకు ఫెర్టిజెల్ 1% బదిలీ అయ్యే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, ఈ**

**ముఖ్యమైన సూచనలను అనుసరించండి:**

- షార్ట్ స్లీవ్ టీ-షర్ట్ తో కప్పబడిన మీ భుజాలు మరియు పై చేతులకు మాత్రమే ఫెర్టిజెల్ 1% వర్తించండి.
- 1% అప్లై చేసిన తర్వాత మీ చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో వెంటనే కడగాలి.
- జెల్ ఆరిన తర్వాత, అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని దుస్తులతో కప్పండి. మీరు అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని బాగా కడగడం లేదా స్నానం చేసే వరకు ఆ ప్రాంతాన్ని కప్పి ఉంచండి.
- మీరు మరొక వ్యక్తితో చర్మం నుండి చర్మానికి సంబంధం కలిగి ఉండాలని ఆశించినట్లయితే, మొదట అనువర్తన ప్రాంతాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి.

ఒక పిల్లవాడు లేదా స్త్రీ మీరు ఎఫ్ ఆర్ టి 1% అప్లై చేసిన ప్రాంతాన్ని తాకినట్లయితే , ఆ ప్రాంతాన్ని వెంటనే సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి.

### Preparation Instructions






Wash your  
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

### Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


## Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeve T-shirt.



AVOID SKIN CONTACT WITH OTHERS



NO WATER EXPOSURE

### ఫెర్టిజెల్ 1% అంటే ఏమిటి?

ఫెర్టిజెల్ 1% అనేది టెస్టోస్టెరాన్ కలిగి ఉన్న ప్రీస్క్రిప్షన్ మందు. కొన్ని వైద్య పరిస్థితుల కారణంగా టెస్టోస్టెరాన్ తక్కువగా లేదా లేని వయోజన పురుషులకు చికిత్స చేయడానికి ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగించబడుతుంది.

- మీరు ప్రారంభించడానికి ముందు మరియు మీరు ఫెర్టిజెల్ 1 ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత మీ రక్తాన్ని పరీక్షిస్తారు .
- వృద్ధాప్యం కారణంగా తక్కువ టెస్టోస్టెరాన్ ఉన్న పురుషులకు చికిత్స చేయడానికి ఫెర్టిజెల్ 1% సురక్షితం లేదా ప్రభావవంతంగా ఉందో లేదో తెలియదు.
- 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలలో ఫెర్టిజెల్ 1% సురక్షితంగా లేదా ప్రభావవంతంగా ఉందో లేదో తెలియదు. ఫెర్టిజెల్ 1% సరిగ్గా ఉపయోగించకపోవడం పిల్లలలో ఎముక పెరుగుదలను ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఫెర్టిజెల్ 1% నియంత్రిత పదార్థం ఎందుకంటే ఇది టెస్టోస్టెరాన్ కలిగి ఉంటుంది, ఇది ప్రీస్క్రిప్షన్ మందులను దుర్వినియోగం చేసే వ్యక్తులకు లక్ష్యంగా ఉంటుంది. దానిని సంరక్షించడానికి మీ ఫెర్టిజెల్ 1% ను సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉంచండి. మీకు ఉన్న అదే లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ, మీ 1% ను మరొకరికి ఇవ్వవద్దు. ఈ మందును అమ్మడం లేదా ఇవ్వడం ఇతరులకు హాని కలిగిస్తుంది మరియు చట్టానికి విరుద్ధం.

**\* ఫెర్టిజెల్ 1% పురుషులకు మాత్రమే మరియు మహిళలు ఉపయోగించకూడదు.**

మీరు ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగించవద్దు:

- ఫెర్టిజెల్ ఉపయోగించవద్దు 1% ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కలిగి ఉండవచ్చు లేదా ఉండవచ్చు.
- గర్భవతిగా ఉంటే 1% మీ పుట్టబోయే బిడ్డకు హాని కలిగించవచ్చు.
- గర్భిణీ స్త్రీలు ఫెర్టిజెల్ 1% వర్తించిన చర్మం యొక్క ప్రాంతంతో సంబంధాన్ని నివారించాలి.

ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగించే ముందు, మీ అన్ని వైద్య పరిస్థితుల గురించి మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతకు చెప్పండి, వీటిలో:

- రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉంది.
- ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కలిగి ఉండవచ్చు లేదా ఉండవచ్చు.
- విస్తరించిన ప్రోస్టేట్ కారణంగా మూత్ర సమస్యలు ఉన్నాయి.
- గుండె సమస్యలు ఉన్నాయి.
- మూత్రపిండాలు లేదా కాలేయ సమస్యలు ఉన్నాయి.
- మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు ఉన్నాయి (స్లేప్ అప్నియా).

ప్రీస్క్రిప్షన్ మరియు ఓవర్ ది కౌంటర్ మందులు, విటమిన్లు మరియు మాలికా మందులతో సహా మీరు తీసుకునే అన్ని మందుల గురించి మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతకు చెప్పండి. కొన్ని ఇతర మందులతో ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగించడం ఒకరినొకరు ప్రభావితం చేస్తుంది.

ముఖ్యంగా, మీరు తీసుకుంటే మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతకు చెప్పండి:

- ఇన్సులిన్
- రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని తగ్గించే మందులు (రక్తం సన్నబడటం) కార్డికోస్టెరాయిడ్స్

### నేను ఫెర్టిజెల్ 1% ఎలా ఉపయోగించాలి?

- ఈ మెడిసిన్ గైడ్ యొక్క చివరలో FERTIGEL 1% ఎలా ఉపయోగించాలనే దాని గురించి ఉపయోగం కొరకు వివరణాత్మక సూచనలను చూడండి.
- మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత మీకు చెప్పిన విధంగా మీరు 1% వర్తింపజేయడం చాలా ముఖ్యం.
- మీ హెల్కేర్ ప్రొవైడర్ మీ 1% మోతాదును మార్చవచ్చు. మీ హెల్కేర్ ప్రొవైడర్ మాట్లాడకుండా మీ 1% మోతాదును మార్చవద్దు.

**ప్రతిరోజూ ఉదయం ఒకే సమయంలో ఫెర్టిజెల్ 1% వర్తించండి. స్నానం చేసిన తర్వాత లేదా స్నానం చేసిన తర్వాత ఫెర్టిజెల్ 1% అపై చేయాలి.**

### ఫెర్టిగేల్ 1 యొక్క సంభావ్య దుష్ప్రభావాలు ఏమిటి?

**ఫెర్టిజెల్ 1% వీటితో సహా తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది:**

చూడండి "ఫెర్టిజెల్ 1% గురించి నేను తెలుసుకోవలసిన అత్యంత ముఖ్యమైన సమాచారం ఏమిటి?"

- మీకు ఇప్పటికే మీ ప్రోస్టేట్ గ్రంథి విస్తరణ ఉంటే, ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మీ సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు మరింత దిగజారిపోతాయి. ఇందులో ఇవి ఉండవచ్చు:
  - రాత్రిపూట మూత్రవిసర్జన పెరుగుతుంది.
  - మీ మూత్ర ప్రవాహాన్ని ప్రారంభించడంలో ఇబ్బంది.
  - పగటిపూట చాలాసార్లు మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి ఉంటుంది.
  - వెంటనే బాత్రూంకు వెళ్లాలనే కోరిక కలిగింది.
  - మూత్ర ప్రమాదం కలిగి ఉండటం.
  - మూత్ర విసర్జన చేయలేకపోవడం లేదా బలహీనమైన మూత్ర ప్రవాహం.
- ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. మీరు ప్రారంభించడానికి ముందు మరియు మీరు ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ లేదా ఇతర ప్రోస్టేట్ సమస్యల కోసం మిమ్మల్ని తనిఖీ చేయాలి.
- కాళ్ళు లేదా ఊపిరితిత్తులలో రక్తం గడ్డకట్టడం. మీ కాలులో రక్తం గడ్డకట్టడం యొక్క సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు కాలు నొప్పి, వాపు లేదా ఎరుపును కలిగి ఉంటాయి. మీ ఊపిరితిత్తులలో రక్తం గడ్డకట్టే సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా ఛాతీ నొప్పిని కలిగి ఉంటాయి.
- గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
- పెద్ద మోతాదులో ఫెర్టిజెల్ 1% మీ స్పెర్మ్ కౌంటు తగ్గిస్తుంది.
- గుండె వైఫల్యంతో లేదా లేకుండా మీ చీలమండలు, పాదాలు లేదా శరీరం యొక్క వాపు.
- విస్తరించిన లేదా బాధాకరమైన రొమ్ములు.
- మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు ఉన్నాయి (స్లీప్ అప్నియా).

**మీకు పైన జాబితా చేయబడిన తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు ఏవైనా ఉంటే వెంటనే మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతకు కాల్ చేయండి. ఫెర్టిజెల్ 1% యొక్క అత్యంత సాధారణ దుష్ప్రభావాలు:**

- పెరిగిన ప్రోస్టేట్ నిర్దిష్ట యాంటిజెన్ (ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కోసం స్క్రీనింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించే పరీక్ష)
- మూడ్ స్వింగ్స్
- అధిక రక్తపోటు
- పెరిగిన ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య
- ఫెర్టిజెల్ 1% వర్తించే చోట చర్మపు చికాకు

**ఇతర దుష్ప్రభావాలలో** మీకు సాధారణం కంటే ఎక్కువ అంగస్తంభనలు లేదా ఎక్కువ కాలం కొనసాగే అంగస్తంభనలు ఉంటాయి. మీకు ఇబ్బంది కలిగించే లేదా పోని ఏదైనా దుష్ప్రభావం ఉంటే మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతకు చెప్పండి.

ఇవన్నీ ఫెర్టిజెల్ 1 యొక్క సంభావ్య దుష్ప్రభావాలు కావు. మరింత సమాచారం కోసం, మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత లేదా ఫార్మసిస్టు అడగండి.

**FERTIGEL 1% యొక్క సురక్షితమైన మరియు సమర్థవంతమైన ఉపయోగం గురించి సాధారణ సమాచారం**

మందులు కొన్నిసార్లు మందుల గైడ్ జాబితా చేయబడినవి కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం సూచించబడతాయి.

సిఫారసు చేయని పరిస్థితికి ఫెర్టిజెల్ 1% ఉపయోగించవద్దు. మీకు ఉన్న అదే లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇతర వ్యక్తులకు

1% ఇవ్వవచ్చు. అది వారికి హాని కలిగించవచ్చు. మీరు సమాచారం కోసం మీ ఫార్మసిస్ట్ లేదా హెల్త్కేర్ ప్రొవైడర్ను అడగవచ్చు  
ఫెర్టిజెల్ గురించి 1% ఇది ఆరోగ్య నిపుణుల కోసం వ్రాయబడింది.

### ఫెర్టిగెల్ 1 లోని పదార్థాలు ఏమిటి?

**క్రియాశీల పదార్థం:** టెస్టోస్టెరాన్ అనానోయేట్ (5 మి.గ్రా ట్యూబ్ జెల్ బేస్లో 50 మి.గ్రా టెస్టోస్టెరాన్ కలిగి ఉంటుంది)

**క్రియారహిత పదార్థాలు:** జెల్ బేస్ క్యూ.ఎస్.



మార్కెట్ చేసిన వారు: ఫెర్టిలైజ్డ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 1/28 మెయిన్ రోడ్, ములంగుడి పోస్ట్, కొడవసల్ తాలూకా, తిరువారూర్ జిల్లా, తమిళనాడు, ఇండియా 612610.

మెయిల్ ఐడీ : [fertigel@fertillmed.com](mailto:fertigel@fertillmed.com). వెబ్ సైట్ : [www.fertillmed.com/fertigel](http://www.fertillmed.com/fertigel)



ఇక్కడ స్కాన్ చేయండి  
దీని గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి  
ఫెర్టిజెల్ 1%.