

औषधोपचार मार्गदर्शक
फर्टिजेल 1%
(टेस्टोस्टेरोन ट्रांसडर्मल जेल) सामयिक वापरासाठी
(टेस-टीओएस-ते-रॉन)

फर्टिजेल 1% बदल मला माहित असणे आवश्यक असलेली सर्वात महत्वाची माहिती कोणती आहे

एक. फर्टिजेल 1% आपल्या शरीरातून इतरांमध्ये हस्तांतरित होऊ शकते, यासह:

मुले आणि स्त्रिया. मुले आणि महिलांनी न धुतलेल्या किंवा न झाकलेल्या (कपडे नसलेल्या) भागांशी संपर्क टाळला पाहिजे जिथे आपल्या त्वचेवर एफआरटीजीईएल 1% लागू केले गेले आहे. पौगंडावस्थेची सुरुवातीची चिन्हे आणि लक्षणे लहान मुलांमध्ये आढळली आहेत जे पुरुषांनी 1% वापरलेल्या भागांना स्पर्श करून टेस्टोस्टेरोनच्या थेट संपर्कात आले आहेत.



लहान मुले

एखाद्या मुलामध्ये लवकर तारुण्य येण्याची चिन्हे आणि लक्षणे जेव्हा ते फर्टिजेल 1% च्या थेट संपर्कात येतात यात हे समाविष्ट असू शकते:

असामान्य लैंगिक बदल:

- वाढलेले लिंग किंवा क्लिटोरिस.
- योनीजवळ किंवा लिंगाभोवती (प्यूबिक केस) केसांची लवकर वाढ.
- इरेक्शन किंवा लैंगिक इच्छा (सेक्स ड्राइव्ह) पूर्ण करणे.

वर्तन समस्या:

आक्रमकपणे वागणे, रागीट किंवा हिंसक मार्गाने वागणे.

महिला

जेव्हा स्त्रिया फर्टिजेल 1% च्या थेट संपर्कात येतात तेव्हा त्यांच्यातील चिन्हे आणि लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट असू शकते:

- शरीराच्या केसांमध्ये बदल.
- पिंपल्स (मुरुम) मध्ये असामान्य वाढ.

फर्टिजेल 1% वापरणे थांबवा आणि जर आपल्याला एखाद्या मुलामध्ये किंवा महिलेमध्ये कोणतीही चिन्हे आणि लक्षणे दिसली तर ताबडतोब आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्यास कॉल करा जे आपण ज्या भागात एफआरटीआयजीएल 1% लागू केले आहे त्या भागाच्या अपघाती स्पर्शामुळे उद्भवू शकते.

दो. आपल्या शरीरातून इतरांमध्ये एफआरटीआयजीएल 1% हस्तांतरित होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी, या

महत्त्वपूर्ण सूचनांचे अनुसरण करा:


- फक्त आपल्या खांद्यावर आणि वरच्या हातांवर 1% एफआरटीआयजीएल लावा जे शॉर्ट स्लीव्ह टी-शर्टने झाकले जाईल.
- 1% एफआरटीआयजीएल लावल्यानंतर आपले हात ताबडतोब साबण आणि पाण्याने धुवा.
- जेल कोरडे झाल्यानंतर, अनुप्रयोग क्षेत्र कपड्यांनी झाकून ठेवा. आपण अनुप्रयोग क्षेत्र चांगले धुतल्याशिवाय किंवा अंघोळ होईपर्यंत क्षेत्र झाकून ठेवा.
- आपण दुसऱ्या व्यक्तीशी त्वचेपासून त्वचेपर्यंत संपर्क साधण्याची अपेक्षा असल्यास, प्रथम साबण आणि पाण्याने अनुप्रयोग क्षेत्र चांगले धुवा.

जर एखाद्या मुलाने किंवा स्त्रीने आपण ज्या भागात एफआरटीआयजीएल लावला आहे त्या भागाला स्पर्श केल्यास ते क्षेत्र मुलावर किंवा स्त्रीवर ताबडतोब साबण आणि पाण्याने चांगले धुवावे.

Preparation Instructions






Wash your
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeve T-shirt.



**AVOID SKIN
CONTACT WITH
OTHERS**



**NO WATER
EXPOSURE**

फर्टिजेल 1% म्हणजे काय?

फर्टिजेल 1% हे एक प्रिस्क्रिप्शन औषध आहे ज्यात टेस्टोस्टेरॉन असते. **फर्टिजेल 1%** प्रौढ पुरुषांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते ज्यांना विशिष्ट वैद्यकीय परिस्थितीमुळे टेस्टोस्टेरॉन कमी किंवा नसते.

- आपला आरोग्य सेवा प्रदाता आपण प्रारंभ करण्यापूर्वी आणि आपण 1% वापरत असताना आपल्या रक्ताची चाचणी घेईल .
- वृद्धत्वामुळे कमी टेस्टोस्टेरॉन असलेल्या पुरुषांवर उपचार करण्यासाठी एफआरटीआयजीएल 1% सुरक्षित किंवा प्रभावी आहे की नाही हे माहित नाही.
- हे माहित नाही की 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये एफआरटीआयजीएल 1% सुरक्षित किंवा प्रभावी आहे की नाही. 1% च्या अयोग्य वापरामुळे मुलांच्या हाडांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

फर्टिजेल 1% हा एक नियंत्रित पदार्थ आहे कारण त्यात टेस्टोस्टेरॉन असते जे प्रिस्क्रिप्शन औषधांचा गैरवापर करणार्या लोकांसाठी लक्ष्य असू शकते. त्याचे संरक्षण करण्यासाठी आपले फर्टिजेल 1% सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. आपल्याकडे समान लक्षणे असली तरीही आपले एफटीएफ1% इतर कोणालाही देऊ नका. हे औषध विकणे किंवा देणे इतरांना हानी पोहोचवू शकते आणि कायद्याच्या विरोधात आहे.

* फर्टिजेल 1% फक्त पुरुषांसाठी असून महिलांनी वापरू नये.

आपण 1% फर्टिजेल वापरू नका:

- फर्टिजेल वापरू नका 1% लोकांना प्रोस्टेट कर्करोग आहे किंवा असू शकतो.
- गरोदर आहत 1% आपल्या गर्भातील बाळाला हानी पोहोचवू शकतात.
- ज्या स्त्रिया गर्भवती आहेत त्यांनी त्वचेच्या त्या भागाशी संपर्क टाळला पाहिजे जिथे एफआरटीजीएल 1% लागू केले गेले आहे.

1% वापरण्यापूर्वी, आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्यास आपल्या सर्व वैद्यकीय परिस्थितींबद्दल सांगा, यासह:

- स्तनाचा कर्करोग आहे.
- प्रोस्टेट कर्करोग आहे किंवा असू शकतो.
- वाढलेल्या प्रोस्टेटमुळे मूत्रमार्गाची समस्या उद्भवते.
- हृदयाची समस्या आहे.
- - मूत्रपिंड किंवा यकृत समस्या आहे.
- झोपताना श्वास घेण्यास त्रास होतो (स्लीप एपनिया).

प्रिस्क्रिप्शन आणि ओव्हर-द-काउंटर औषधे, जीवनसत्त्वे आणि हर्बल पूरक आहारांसह आपण घेत असलेल्या सर्व औषधांबद्दल आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्यास सांगा. इतर काही औषधांसह फर्टिजेल 1% वापरल्यास एकमेकांवर परिणाम होऊ शकतो.

विशेषतः, आपण घेतल्यास आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्यास सांगा:

- इन्सुलिन
- रक्त गोठणे कमी करणारी औषधे (रक्त पातळ करणारी) कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स

मी फर्टिजेल 1% कसे वापरावे?

- या औषध मार्गदर्शकाच्या शेवटी फर्टिजेल 1% कसे वापरावे याबद्दल वापरासाठी तपशीलवार सूचना पहा.
- हे महत्वाचे आहे की आपण आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्याने सांगितल्याप्रमाणे 1% एफआरटीआयजीएल लागू करा.
- आपला आरोग्य सेवा प्रदाता आपला 1% डोस बदलू शकतो. आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्याशी बोलल्याशिवाय आपला 1% डोस बदलू नका.

दररोज सकाळी एकाच वेळी 1% एफआरटीआयजीएल लावा. अंधोळ किंवा अंधोळीनंतर 1% फर्टिजेल लावावे.

फर्टिजेल 1% चे संभाव्य दुष्परिणाम काय आहेत?

फर्टिजेल 1% मुळे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात यासह:

पहा "मला फर्टिजेल 1% बद्दल माहित असणे आवश्यक असलेली सर्वात महत्वाची माहिती कोणती आहे?"

- जर आपल्याकडे आधीच आपल्या पुरः स्थ ग्रंथीची वाढ झाली असेल तर एफईटी 1% वापरताना आपली चिन्हे आणि लक्षणे खराब होऊ शकतात. यात हे समाविष्ट असू शकते:
 - ओ रात्री लघवी वाढणे.
 - ओ मूत्र प्रवाह सुरू करण्यास त्रास.

ओ दिवसभरात अनेकवेळा लघवी करावी लागते.

ओ ताबडतोब बाथरूममध्ये जाण्याची इच्छा असणे.

ओ लघवीचा अपघात होणे.

ओ मूत्र किंवा कमकुवत मूत्र प्रवाह पार करण्यास असमर्थ असणे.

- **प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका वाढण्याची शक्यता.** आपण प्रारंभ करण्यापूर्वी आणि आपण 1% वापरत असताना आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्याने प्रोस्टेट कर्करोग किंवा इतर कोणत्याही प्रोस्टेट समस्येसाठी आपली तपासणी केली पाहिजे.
- **पाय किंवा फुफ्फुसात रक्ताच्या गुठळ्या होतात.** आपल्या पायात रक्ताच्या गुठळ्या होण्याच्या चिन्हे आणि लक्षणांमध्ये पाय दुखणे, सूज येणे किंवा लालसरपणा यांचा समावेश असू शकतो. आपल्या फुफ्फुसांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या होण्याच्या चिन्हे आणि लक्षणांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा छातीत दुखणे समाविष्ट असू शकते.
- **हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा संभाव्य धोका.**
- **मोठ्या डोसमध्ये, एफईटी 1% आपल्या शुक्राणूंची संख्या कमी करू शकते.**
- **हृदय अपयशासह किंवा त्याशिवाय आपल्या टाचे, पाय किंवा शरीराची सूज.**
- **वाढलेले किंवा वेदनादायक स्तन.**
- **झोपताना श्वास घेण्यास त्रास होतो (स्लीप एपनिया).**

आपल्याकडे वर सूचीबद्ध केलेले कोणतेही गंभीर दुष्परिणाम असल्यास ताबडतोब आपल्या आरोग्य सेवा

प्रदात्यास कॉल करा. फर्टिजेल 1% च्या सर्वात सामान्य दुष्परिणामांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

- - वाढीव प्रोस्टेट विशिष्ट प्रतिजन (प्रोस्टेट कर्करोगाची तपासणी करण्यासाठी वापरली जाणारी चाचणी)
- मूड स्विंग्स
- उच्च रक्तदाब
- लाल रक्तपेशींची संख्या वाढली
- त्वचेची जळजळ जिथे एफआरटीआयजीएल 1% लागू केले जाते

इतर दुष्परिणामांमध्ये आपल्यासाठी सामान्यपेक्षा जास्त इरेक्शन किंवा दीर्घकाळ टिकणार्या इरेक्शनचा समावेश आहे.

आपल्याला त्रास देणारे किंवा दूर होत नसलेले कोणतेही दुष्परिणाम असल्यास आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्यास सांगा.

हे सर्व एफईटीजीएल 1% चे संभाव्य दुष्परिणाम नाहीत. अधिक माहितीसाठी, आपल्या आरोग्य सेवा प्रदात्यास किंवा फार्मासिस्टला विचारा.

फर्टिगेलच्या सुरक्षित आणि प्रभावी वापराबद्दल सामान्य माहिती 1%

औषधे कधीकधी औषधोपचार मार्गदर्शकात सूचीबद्ध केलेल्या व्यतिरिक्त इतर हेतूसाठी लिहून दिली जातात. ज्या अवस्थेसाठी ते निर्धारित केले गेले नाही अशा अवस्थेसाठी फर्टिजेल 1% वापरू नका. आपल्याकडे समान लक्षणे असली तरीही इतर लोकांना 1% देऊ नका. यामुळे त्यांचे नुकसान होऊ शकते. आपण माहितीसाठी आपल्या फार्मासिस्ट किंवा आरोग्य सेवा प्रदात्यास विचारू शकता आरोग्य व्यावसायिकांसाठी लिहिल्या गेलेल्या 1% बद्दल एफआरटीआयजीईएल 1% आहे.

एफआरटीआयजीएल 1% मध्ये कोणते घटक आहेत?

सक्रिय घटक: टेस्टोस्टेरॉन अनडेकॅनोएट (5 मिलीग्राम ट्यूब जेल बेसमध्ये 50 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरॉन असते)

निष्क्रिय घटक: जेल बेस क्यू.एस.



विपणक : फर्टिलमेड फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, १२८ मेनरोड, मुळगुडी पोस्ट, कोडवासल तालुका, तिरुवरूर जिल्हा, तामिळनाडू, भारत ६१२६१०.

मेल आयडी : fertigel@fertillmed.com. संकेतस्थळ : www.fertillmed.com/fertigel



येथे स्कॅन करा
याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी

फर्टिजेल 1%