

ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1%
(ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮರ್ಲ್ ಜೆಲ್) ಸಮಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ
(tes-TOS-te-ron)

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು

1. ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು,

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ತೊಳೆಯದ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ (ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದ) ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಳಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.



ಮಕ್ಕಳು

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು

ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

ಅಸಹಜ ಲೈಂಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:

- ಹಿಗ್ಗಿದ ಶಿಶ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್.
- ಯೋನಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಶಿಶ್ನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂದಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಗುಹ್ಯ ಕೂದಲು).
- ನಿಮಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ).

ವರ್ತನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:

ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದು.

ಮಹಿಳೆಯರು

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

- ದೇಹದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
- ಮೊಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಹೆಚ್ಚಳ (ಮೊಡವೆ).

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಗು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

2. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು,

ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

- ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಅದು ಸಣ್ಣ ತೋಳಿನ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಜೆಲ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ನೀವು ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
- ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು

ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ನೀವು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಗು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಮಗು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

Preparation Instructions






Wash your
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeve T-shirt.



AVOID SKIN CONTACT WITH OTHERS



NO WATER EXPOSURE

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಎಂದರೇನು?

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇಲ್ಲದ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
- 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನ ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಸ್ಕಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 1% ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನೀಡುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

* ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಸಬಾರದು.

ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ **FERTIGEL 1%** ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ:

- ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ ಬಳಸಬೇಡಿ 1% ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು.
- ಗರ್ಭಿಣಿ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

FERTIGEL 1% ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ:

- ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ.
- ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
- ಹಿಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
- ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ (ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ).

ಪ್ರಿಸ್ಕಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್ ಔಷಧಿಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪೂರಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇತರ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ:

- ಇನ್ಸುಲಿನ್
- ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳು (ರಕ್ತ ತಳುವಾಗುವಿಕೆಗಳು) ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಗಳು

ನಾನು FERTIGEL 1% ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

- ಈ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ FERTIGEL 1% ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
- ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ .

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು

ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು:

ನೋಡಿ "ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು?"

- ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಇದು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:
 - ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ.
 - ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ.
 - ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.
 - ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ.
 - ಮೂತ್ರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು.
 - ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಹರಿವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದು.
- ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
- ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಲು ನೋವು, ಊತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
- ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಊತ.
- ಹಿಗ್ಗಿದ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಸ್ತನಗಳು.
- ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ (ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ).

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. FERTIGEL 1% ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇರಿವೆ:

- ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಜನಕ (ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ)
- ಮನಸ್ಸಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಅನ್ವಯಿಸುವ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಇತರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ

ಉಳಿಯುವ ನಿಮಿರುವಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಅಥವಾ ಹೋಗದ ಯಾವುದೇ

ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಇವು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಕಾರರನ್ನು ಕೇಳಿ.

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ FERTIGEL 1% ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ . ಇತರ ಜನರು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ 1% ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಕಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುಗರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1% ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ: ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅನ್ಡೆಕಾನೋಯೇಟ್ (5 ಮಿಗ್ರಾಂ ಟ್ಯಾಬ್ ಜೆಲ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮಿಗ್ರಾಂ

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ)

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಜೆಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್.



ಮಾರಾಟ: ಫೆರ್ಟಿಲ್ ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 1/28 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುಳನಗುಡಿ ಪೊರೈವಳ್ಳಿ, ಕೊಡವಸಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿರುವರೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಭಾರತ 612610.

ಮೇಲ್ ಐಡಿ : fertigel@fertillmed.com. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.fertillmed.com/fertigel



ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಫೆರ್ಟಿಜೆಲ್ 1%.