

മെഡിക്കേഷൻ ഗൈഡ്

ഫെർട്ടിഗൽ 1%

(ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ട്രാൻസ്ഡെർമൽ ജെൽ) ടോപ്പിക്കൽ ഉപയോഗത്തിനായി
(tes-TOS-te-ron)

FERTIGEL 1% നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്താണ്

1. FERTIGEL 1% നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയും,

കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഫെർട്ടിജെൽ 1% പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കഴുകാത്തതോ മൂടാത്തതോ ആയ (വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത) പ്രദേശങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒഴിവാക്കണം. പുരുഷന്മാർ ഫെർട്ടിഗൽ 1% ഉപയോഗിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.



കുട്ടികൾ

ഫെർട്ടിജെലുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയിൽ നേരത്തെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും 1%

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടാം:

അസാധാരണമായ ലൈംഗിക മാറ്റങ്ങൾ:

- വലുതായ ലിംഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിറ്റോറിസ്.
- യോനിക്കടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള രോമത്തിന്റെ ആദ്യകാല വളർച്ച (ഗുഹ്യ രോമം).
- ഉദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പ്രേരണകൾ (സെക്സ് ഡ്രൈവ്).

പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ:

ആക്രമണോത്സുകമായി പെരുമാറുക, ദേഷ്യത്തോടെയോ അക്രമാസക്തമായോ പെരുമാറുക.

സ്ത്രീകൾ

ഫെർട്ടിജെലുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിലെ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും 1% ഉൾപ്പെടാം:

- ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ.
- മുഖക്കുരുവിന്റെ (മുഖക്കുരു) അസാധാരണമായ വർദ്ധനവ്.

ഫെർട്ടിഗെൽ 1% ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക, നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിജെൽ 1% പ്രയോഗിച്ച പ്രദേശത്ത് ആകസ്മികമായി സ്പർശിച്ചതിലൂടെ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു കുട്ടിയിലോ സ്ത്രീയിലോ കണ്ടാൽ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനെ വിളിക്കുക.

2. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഫെർട്ടിജെൽ 1% കൈമാറ്റം

ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ഈ സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക:


- ഒരു ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ടീ-ഷർട്ട് കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ തോളുകളിലും മുകൾ കൈകളിലും മാത്രം ഫെർട്ടിഗൽ 1% പ്രയോഗിക്കുക.
- ഫെർട്ടിജെൽ 1% പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക.
- ജെൽ ഉണങ്ങിയ ശേഷം, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂടുക. നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ നന്നായി കഴുകുകയോ കുളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ പ്രദേശം മൂടിവയ്ക്കുക.
- മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തിലേക്ക് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആദ്യം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ നന്നായി കഴുകുക.

നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിജെൽ പ്രയോഗിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടിയോ സ്ത്രീയോ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുട്ടിയുടെയോ സ്ത്രീയുടെയോ മേലുള്ള ആ ഭാഗം ഉടൻ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം.

Preparation Instructions




Wash your
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeve T-shirt.



AVOID SKIN CONTACT WITH OTHERS



NO WATER EXPOSURE

എന്താണ് FERTIGEL 1%?

ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പടി മരുന്നാണ് ഫെർട്ടിഗൽ 1%. ചില മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ കാരണം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കുറവോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാരെ ചികിത്സിക്കാൻ ഫെർട്ടിഗൽ 1% ഉപയോഗിക്കുന്നു.

- നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിജെൽ 1% ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവ് നിങ്ങളുടെ രക്തം പരിശോധിക്കും .
- വാർദ്ധക്യം കാരണം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കുറവുള്ള പുരുഷന്മാരെ ചികിത്സിക്കാൻ ഫെർട്ടിജെൽ 1% സുരക്ഷിതമാണോ അതോ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് അറിയില്ല.
- 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഫെർട്ടിജെൽ 1% സുരക്ഷിതമാണോ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഫെർട്ടിജെൽ 1% അനുചിതമായ ഉപയോഗം കുട്ടികളിലെ അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിച്ചേക്കാം.

ഫെർട്ടിഗൽ 1% ഒരു നിയന്ത്രിത പദാർത്ഥമാണ്, കാരണം അതിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് കുറിപ്പടി മരുന്നുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ലക്ഷ്യമാകാം. നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിജെൽ 1% സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായ

ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിജെൽ 1% മറ്റാർക്കും നൽകരുത്. ഈ മരുന്ന് വിൽക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്തേക്കാം, ഇത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.

*** ഫെർട്ടിഗൽ 1% പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, സ്ത്രീകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്.**

നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫെർട്ടിജെൽ 1% ഉപയോഗിക്കരുത്:

- FERTIGEL ഉപയോഗിക്കരുത് 1% പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം.
- ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ FERTIGEL 1% നിങ്ങളുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
- ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഫെർട്ടിജെൽ 1% പ്രയോഗിച്ച ചർമ്മ പ്രദേശവുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം.

FERTIGEL 1% ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനോട് പറയുക:

- സ്കനാർബുദം ഉണ്ട്.
- പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം.
- പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്.
- ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്.
- വൃക്ക അല്ലെങ്കിൽ കരൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്.
- നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് (സ്ലീപ് അപ്പിയ).

കുറിപ്പടി, ഓവർ-ദി-കൗണ്ടർ മരുന്നുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ഹെർബൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനോട് പറയുക. മറ്റ് ചില മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ഫെർട്ടിഗൽ 1% ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരസ്പരം ബാധിക്കും.

പ്രത്യേകിച്ചും, നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനോട് പറയുക:

- ഇൻസുലിൻ
- രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ (രക്തം നേർത്തത്) കോർട്ടികോസ്റ്റിറോയിഡുകൾ

ഫെർട്ടിഗെൽ 1% എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം?

- ഈ മെഡിക്കേഷൻ ഗൈഡിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫെർട്ടിഗെൽ 1% എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.
- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിജെൽ 1% പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവ് നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിജെൽ 1% ഡോസ് മാറ്റിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനോട് സംസാരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിജെൽ 1% ഡോസ് മാറ്റരുത്.

എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരേ സമയത്ത് ഫെർട്ടിജെൽ 1% പ്രയോഗിക്കുക. കുളിക്കുമ്പോഴോ കുളിച്ചതിനു ശേഷമോ 1% പുരട്ടണം.

FERTIGEL 1%-ന്റെ സാധ്യമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

FERTIGEL 1% ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ

പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും:

കാണുക "FERTIGEL 1% -നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്താണ്?"

- നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വിപുലീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെർട്ടിജെൽ 1% ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും വഷളാകാം. ഇതിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടാം:

- o രാത്രിയിൽ മുത്രമൊഴിക്കൽ വർദ്ധിക്കുന്നു.
- o നിങ്ങളുടെ മുത്രപ്രവാഹം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്.
- o പകൽ സമയത്ത് നിരവധി തവണ മുത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഉടനെ ബാത്ത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള പ്രേരണ.
- o മുത്രത്തിന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു.
- o മുത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമായ മുത്രപ്രവാഹം.
- **പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.** നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിജെൽ 1% ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.
- **കാലുകളിലോ ശ്വാസകോശങ്ങളിലോ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നു.** നിങ്ങളുടെ കാലിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും കാല് വേദന, വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ശ്വാസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.
- **ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.**
- **വലിയ അളവിൽ FERTIGEL 1% നിങ്ങളുടെ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചേക്കാം.**
- **ഹൃദയസ്തംഭനത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങളുടെ കണക്കാൽ, പാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്നിവയുടെ വീക്കം.**
- **വലുതായതോ വേദനയുള്ളതോ ആയ സ്തനങ്ങൾ.**
- **നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് (സ്ലീപ് അപ്നിയ).**

മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനെ വിളിക്കുക. FERTIGEL 1% ന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

- വർദ്ധിച്ച പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിജൻ (പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിശോധന)
- മാനസികാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ
- ഹൈപ്പർടെൻഷൻ
- ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു
- ഫെർട്ടിജെൽ 1% പ്രയോഗിക്കുന്ന ചർമ്മത്തിലെ അസ്വസ്ഥത

മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉദ്ധാരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോകാത്ത എന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനോട് പറയുക.

FERTIGEL 1-ന്റെ സാധ്യമായ എല്ലാ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവിനോടോ ഫാർമസിസ്റ്റിനോടോ ചോദിക്കുക.

FERTIGEL-ന്റെ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ 1%

മെഡിക്കേഷൻ ഗൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവ ഒഴികെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. നിർദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഫെർട്ടിജെൽ 1% ഉപയോഗിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ആളുകൾക്ക് 1% നൽകരുത്. അത് അവരെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാർമസിസ്റ്റിനോടോ ഹെൽത്ത് കെയർ ദാതാവിനോടോ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി എഴുതിയ ഫെർട്ടിജെൽ 1% നെ കുറിച്ച്.

FERTIGEL 1% ലെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സജീവ ഘടകം: ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടാക്കാനായേറ്റ് (5mg ട്യൂബിൽ ജെൽ ബേസിൽ 50 മില്ലിഗ്രാം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു)
നിഷ്ക്രിയ ചേരുവകൾ: ജെൽ ബേസ് q.s.



വിപണനം: ഫെർട്ടിൽമെഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 1/28 മെയിൻറോഡ്, മുളങ്കുടി പോസ്റ്റ്, കൊടവാസൽ താലൂക്ക്, തിരുവാരുർ ജില്ല, തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യ 612610.
മെയിൽ ഐഡി : fertigel@fertillmed.com. വെബ്സൈറ്റ് : www.fertillmed.com/fertigel



ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യുക
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ
ഫെർട്ടിഗൽ 1%.