

દવા માર્ગદર્શિકા
ફર્ટિગેલ ૧%
(ટેસ્ટોસ્ટેરોન ટ્રાન્સડર્મલ જેલ) સ્થાનિક ઉપયોગ માટે
(ટેસ-TOS-te-ron)

એફઆરટીજીએલ ૧% વિશે મારે સૌથી મહત્વની કઈ માહિતી જાણવી જોઈએ

૧. એફઆરટીઆઈજીએલ ૧% તમારા શરીરમાંથી અન્ય લોકોમાં તબદિલ થઈ શકે છે, જેમાં સામેલ છે,

બાળકો અને સ્ત્રીઓ. બાળકો અને મહિલાઓએ તમારી ત્વચા પર જ્યાં એફઆરટીઆઈજીએલ ૧ ટકા લાગુ કરવામાં આવ્યું હોય તેવા એફએઆરટીઆઈજીએલ (એફઆરટીજીએલ)નો સંપર્ક ટાળવો જાઈએ અથવા તો આવરિત ન હોય તેવા (ક્લોથ વગરના) વિસ્તારોના સંપર્કને ટાળવો જાઈએ. તરુણાવસ્થાના પ્રારંભિક ચિહ્નો અને લક્ષણો નાના બાળકોમાં જોવા મળ્યા છે, જેઓ ટેસ્ટોસ્ટેરોનના સીધા સંપર્કમાં આવ્યા છે અને પુરુષોએ જ્યાં પુરુષોએ એફએઆરટીઆઈજીએલનો ૧% ઉપયોગ કર્યો છે તેવા વિસ્તારોને સ્પર્શ કર્યો છે.



બાળકો

જ્યારે બાળક એફઆરટીજીએલના સીધા સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે તેમાં તરુણાવસ્થાના ચિહ્નો અને લક્ષણો ૧% આમાં સામેલ થઈ શકે છે:

અસામાન્ય જાતીય ફેરફારો:

- વિસ્તૃત શિશ્ન અથવા ક્લિટોરિસ.
- યોનિમાર્ગની નજીક અથવા શિશ્નની આસપાસ (પ્યુબિક હેર) વાળનો પ્રારંભિક વિકાસ થાય છે.
- ઇરેક્શન્સ અથવા જાતીય અરજ (સેક્સ ડ્રાઇવ) દ્વારા કામ કરવું.

વર્તણૂક સમસ્યાઓ:

આક્રમક રીતે વર્તવું, ગુસ્સે ભરાયેલી કે હિસક રીતે વર્તવું.

સ્ત્રીઓ

મહિલાઓ જ્યારે એફઆરટીજીએલના સીધા સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે તેમનામાં ચિહ્નો અને લક્ષણો ૧ ટકા આ મુજબ છે:

- શરીરના વાળમાં ફેરફાર.
- ખીલ (ખીલ)માં અસામાન્ય વધારો થાય છે.

એફઆરટીજીએલ ૧% નો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો અને જો તમને કોઈ બાળક અથવા સ્ત્રીમાં કોઈ ચિહ્નો અને લક્ષણો દેખાય તો તરત જ તમારા આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડનારને કોલ કરો, જે તમે જ્યાં એફઆરટીઆઈજીએલ લાગુ કર્યું છે તે વિસ્તારને આકસ્મિક સ્પર્શ કરવાથી થઈ શકે છે.

૨. તમારા શરીરમાંથી એફઆરટીજીએલના ૧ ટકા હસ્તાંતરણનું જાખમ ઘટાડવા માટે, આ મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓનું

પાલન કરો:

- એફઆરટીજીએલને માત્ર તમારા ખભા અને ઉપરના હાથ પર જ લગાવો, જે શોર્ટ સ્લીવ ટી-શર્ટથી ઢંકાયેલા હશે.
- એફઆરટીજીએલ ૧% લગાવ્યા પછી તરત જ તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી ધુઓ.
- જેલ સુકાઈ જાય તે પછી, ઉપયોગના ભાગને કપડાંથી ઢાંકી દો. જ્યાં સુધી તમે એપ્લિકેશન એરિયાને સારી રીતે ધોઈ ન લો અથવા શાવર લો નહીં ત્યાં સુધી તે વિસ્તારને આવરી લેવામાં આવ્યો રાખો.
- જો તમે અન્ય વ્યક્તિ સાથે ત્વચાથી ત્વચાનો સંપર્ક સાધવાની અપેક્ષા રાખતા હોવ, તો સૌપ્રથમ ઉપયોગના વિસ્તારને સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ નાંખો.

જો કોઈ બાળક કે મહિલા તે વિસ્તારને સ્પર્શે છે જ્યાં તમે FERTIGEL લગાવ્યું છે, તો બાળક અથવા સ્ત્રી પર 1% તે વિસ્તારને તરત જ સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ નાખવો જોઈએ.

Preparation Instructions






Wash your
Hands with Soap



Before applying **Fertigel 1%**, make sure that your shoulders, upper arms, or stomach are clean, dry, and there is no broken skin

Fertigel 1% Application Instructions



Apply Fertigel 1% to the shoulders, upper arms, or stomach (abdomen).

Do not apply Fertigel 1% to any other parts of your body such as your penis, scrotum, chest, armpits (axillae), knees, or back.


Post-Application Guidelines for Fertigel 1% (Next 5 Hours)



WASH HANDS



ALLOW TO DRY



The application area should be covered by a short-sleeved T-shirt.



AVOID SKIN CONTACT WITH OTHERS



NO WATER EXPOSURE

એફઆરટીજીએલ 1% શું છે?

એફઆરટીજીએલ 1% એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન મેડિસિન છે જેમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોય છે. એફઆરટીજીએલ 1 ટકાનો ઉપયોગ પુખ્ત વયના પુરુષોની સારવાર માટે થાય છે, જેમને ચોક્કસ તબીબી િસ્થિતિને કારણે ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું પ્રમાણ ઓછું હોય અથવા ન હોય.

- તમારા આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડનાર તમે શરૂ કરો તે પહેલાં અને તમે જ્યારે એફઆરટીઆઈજીએલનો ઉપયોગ કરતા હો ત્યારે તમારા લોહીની ચકાસણી કરશો.
- તે જાણી શકાયું નથી કે એફઆરટીજીએલ 1% એ પુરુષોની સારવાર માટે સલામત છે કે અસરકારક છે જેમને વૃદ્ધત્વને કારણે ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું પ્રમાણ ઓછું છે.
- તે જાણી શકાયું નથી કે એફઆરટીજીએલ 1% 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાં સલામત છે કે અસરકારક છે. એફઆરટીજીએલ 1%નો અયોગ્ય ઉપયોગ બાળકોમાં હાડકાંના વિકાસને અસર કરી શકે છે.

એફઆરટીજીએલ 1% એક નિયંત્રિત પદાર્થ છે કારણ કે તેમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોય છે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવાઓનો દુરુપયોગ કરનારા લોકો માટે લક્ષ્ય બની શકે છે. તેને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમારા એફઆરટીજીએલને 1% સુરક્ષિત સ્થળે રાખો. તમારા FERTIGELને ક્યારેય અન્ય કોઈને 1% આપશો નહીં, પછી ભલે તેઓ તમારા જેવા જ ચિહ્નો ધરાવતા હોય. આ દવાનું વેચાણ અથવા આપવાથી બીજાને નુકસાન થઈ શકે છે અને તે કાયદાની વિરુદ્ધ છે.

* ફર્ટિગેલ 1% માત્ર પુરુષો માટે જ હોય છે અને તેનો ઉપયોગ સ્ત્રીઓએ ન કરવો જોઈએ.

જો તમે: તો એફઆરટીજીએલ 1% નો ઉપયોગ કરશો નહીં.

- એફઆરટીજીએલનો ઉપયોગ કરશો નહીં 1% લોકોને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર છે અથવા હોઈ શકે છે.
- એફઆરટીઆઈજીએલ ગર્ભવતી હોય છે 1% તમારા ગર્ભસ્થ શિશુને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
- જે મહિલાઓ ગર્ભવતી હોય તેમણે ત્વચાના એ ભાગ સાથે સંપર્ક ટાળવો જોઈએ જ્યાં એફઆરટીઆઈજીએલ 1 ટકા લાગુ કરવામાં આવ્યું હોય.

એફઆરટીઆઈજીએલનો 1%નો ઉપયોગ કરતા પહેલાં, તમારા આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડનારને તમારી તમામ તબીબી િસ્થિતિ વિશે જણાવો, જેમાં તમારો સમાવેશ થાય છે કે:

- સ્તન કેન્સર છે.
- પ્રોસ્ટેટ કેન્સર છે અથવા હોઈ શકે છે.
- વિસ્તૃત પ્રોસ્ટેટને કારણે પેશાબની સમસ્યાઓ છે.
- હૃદયની સમસ્યાઓ છે.
- કિડની અથવા યકૃતની સમસ્યાઓ છે.
- જ્યારે તમે સૂતા હો ત્યારે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે (સ્લીપ એપનિયા).

પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને ઓવર-ઘ-કાઉન્ટર દવાઓ, વિટામિન્સ અને હર્બલ સપ્લિમેન્ટ્સ સહિત તમે લો છો તે તમામ દવાઓ વિશે તમારા આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડનારને જણાવો. કેટલીક અન્ય દવાઓ સાથે ફર્ટિગેલનો 1% ઉપયોગ કરવાથી એકબીજાને અસર થઈ શકે છે.

ખાસ કરીને, જો તમે લો છો તો તમારા આરોગ્ય પ્રદાતાને જણાવો:

- ઇન્સ્યુલિન

- ઔષધિઓ જે લોહી ગંઠાઈ જવાનું ઘટાડે છે (લોહી પાતળું કરનાર)
કોર્ટિકોસ્ટેરોઈડ્સ

મારે એફઆરટીજીઈએલ 1%નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ?

- આ મેડિકેશન ગાંઠડના અંતે એફઆરટીજીઈએલ 1%નો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે અંગે ઉપયોગ માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ જુઓ.
- તમારા હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર તમને જે કહે છે તે પ્રમાણે જ તમે એફઆરટીજીઈએલ 1% લાગુ કરો તે મહત્વનું છે.
- તમારા હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર તમારા એફઆરટીજીઈએલ 1% ડોઝમાં ફેરફાર કરી શકે છે. તમારા હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર સાથે વાત કર્યા વિના તમારા એફઆરટીજીઈએલ 1% ડોઝને બદલશો નહીં.

દરરોજ સવારે એક જ સમયે એફઆરટીજીઈએલ 1% લગાવો. એફઆરટીજીઈએલ 1% શાવર લીધા પછી અથવા સ્નાન કર્યા પછી લગાવવું જોઈએ.

એફઆરટીજીઈએલ 1%ની સંભવિત આડઅસરો શું છે?

એફઆરટીજીઈએલ 1% ગંભીર આડઅસરો પેદા કરી શકે છે, જેમાં સામેલ છે:

જુઓ, "એફઆરટીજીઈએલ 1% વિશે મારે સૌથી મહત્વની કઈ માહિતી જાણવી જોઈએ?"

- જો તમને તમારી પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિમાં પહેલેથી જ વધારો થયો હોય તો એફઆરટીજીઈએલ 1%નો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારા ચિહ્નો અને લક્ષણો વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:
ઓ રાત્રે પેશાબમાં વધારો કરે છે.
ઓ તમારા પેશાબનો પ્રવાહ શરૂ કરવામાં મુશ્કેલી.
ઓ દિવસ દરમિયાન ઘણી વખત પેશાબ પસાર કરવો પડે છે.
ઓ તરત જ બાથરૂમમાં જવાની ઇચ્છા થાય છે.
ઓ પેશાબનો અકસ્માત થવો.
○ પેશાબ પસાર કરવામાં અસમર્થ અથવા નબળા પેશાબના પ્રવાહને પસાર કરવામાં અસમર્થ હોવું.
- પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જોખમ વધી શકે છે. તમારા હેલ્થકેર પ્રોવાઇડરે તમે શરૂ કરતા પહેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સર અથવા અન્ય કોઈ પ્રોસ્ટેટ સમસ્યાઓ માટે તમારી તપાસ કરવી જોઈએ અને જ્યારે તમે એફઆરટીજીઈએલ 1% નો ઉપયોગ કરો છો.
- પગ કે ફેફસામાં લોહી ગંઠાઈ જાય છે. તમારા પગમાં લોહી ગંઠાઈ જવાના ચિહ્નો અને લક્ષણોમાં પગનો દુખાવો, સોજો અથવા લાલાશનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તમારા ફેફસાંમાં લોહી ગંઠાઈ જવાના સંકેતો અને લક્ષણોમાં શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી અથવા છાતીમાં દુખાવો શામેલ હોઈ શકે છે.
- હાર્ટ એટેક અથવા સ્ટ્રોકનું જોખમ વધી શકે છે.
- મોટી માત્રામાં એફઆરટીજીઈએલ 1% તમારા શુક્રાણુઓની સંખ્યાને ઘટાડી શકે છે.
- તમારા પગની ઘૂંટી, પગ અથવા શરીર પર સોજો આવવો, હૃદયની નિષ્ફળતા સાથે કે તેના વિના.
- મોટા અથવા પીડાદાયક સ્તનો.
- જ્યારે તમે સૂતા હો ત્યારે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે (સ્લીપ એપનિયા).

જો તમને ઉપર સૂચિબદ્ધ કોઈપણ ગંભીર આડઅસરો હોય તો તરત જ તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને કોલ કરો. એફઆરટીજીઈએલની સૌથી સામાન્ય આડઅસરો 1 ટકામાં સામેલ છે:

- વધેલી પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટિજેન (પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની તપાસ માટે વપરાતું પરીક્ષણ)
- મિજાજ બદલાવો
- હાયપરટેન્શન
- વધેલા લાલ રક્તકણોની ગણતરી
- ત્વચામાં બળતરા જ્યાં ફાયર્ટિજેલ 1% લાગુ કરવામાં આવે છે

અન્ય આડઅસરોમાં તમારા માટે સામાન્ય કરતાં વધુ ઉત્થાન અથવા લાંબા સમય સુધી ટકી રહેલા ઉત્થાનનો સમાવેશ થાય છે. તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને કહો કે જો તમને કોઈ આડઅસર છે જે તમને પરેશાન કરે છે અથવા તે દૂર થતી નથી.

આ એફઆરટીજીઈએલ 1% ની તમામ સંભવિત આડઅસરો નથી. વધુ માહિતી માટે તમારા હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર અથવા ફાર્માસિસ્ટને પૂછો.

એફઆરટીજીઈએલના સલામત અને અસરકારક ઉપયોગ વિશે સામાન્ય માહિતી 1%

દવાઓની માર્ગદર્શિકામાં સૂચિબદ્ધ દવાઓ સિવાયના અન્ય હેતુઓ માટે કેટલીક વખત દવાઓ સૂચવવામાં આવે છે. જે શરત માટે તે સૂચવવામાં આવી ન હોય તેવી સ્થિતિ માટે એફઆરટીજીઈએલ 1 ટકાનો ઉપયોગ કરશો નહીં. અન્ય લોકો માટે 1% એફઆરટીજીઈએલ કરશો નહીં, પછી ભલે તેઓ તમારા જેવા જ ચિહ્નો ધરાવતા હોય. તેનાથી તેમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે તમારા ફાર્માસિસ્ટ અથવા આરોગ્ય સેવા પ્રદાતાને માહિતી માટે પૂછી શકો છો

એફ.ઇ.આર.ટી.જી.ઇ.એલ. વિશે 1% જે આરોગ્ય વ્યાવસાયિકો માટે લખવામાં આવે છે.

એફઆરટીજીઈએલમાં 1% કયા ઘટકો છે?

સક્રિય ઘટક: ટેસ્ટોસ્ટેરોન અનડેકેનોએટ (૫ મિગ્રા ટ્યુબ જેલ બેઝમાં ૫૦ મિગ્રા ટેસ્ટોસ્ટેરોન ધરાવે છે)

નિષ્ક્રિય ઘટકો: જેલ બેઝ ક્યુ.એસ.



દ્વારા માર્કેટિંગ કરવામાં આવે છે: ફર્ટિલમેડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, 1/28 મેઇનરોડ, મુલાનગુડી પોસ્ટ, કોડાવાસલ તાલુકા, થિરુવરુર જિલ્લો, તમિલનાડુ, ભારત 612610.
મેઇલ આઇડી : fertigel@fertillmed.com. વેબસાઇટ : www.fertillmed.com/fertigel



અંદિ સ્કેન કરો
વિશે વધુ જાણવા માટે
ફર્ટિગેલ 1% .