

注射指导

Bravelle® 或 Menopur®

您的医生开具了皮下注射用 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 的处方。注射前，使用相同方法配制带有 Q-CAP® 药瓶接头（如图所示）的 BRAVELLE® 或 MENOPUR®。本指导说明将帮助您在家配制并注射药物。请始终严格按照医嘱使用药物。



准备

1 彻底洗净双手并在清洁表面组装所需用品：




2 掀开一支氯化钠药瓶及医要求使用的一支 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 药瓶的盖子。用酒精棉签擦拭药瓶顶部。

将氯化钠吸入注射器



3 如果注射器上有带针帽的针头，将针头取下并放在一边。将注射器扭到 Q-CAP®（接头端）上。



4 回拉柱塞至黑色标记（黑线）处，该容量相当于医嘱要求的氯化钠量，一般为 1 mL (1 cc)。



5 对着氯化钠瓶向下按压 Q-CAP®，冲破药瓶。然后向下按柱塞到底，将空气注入瓶中。继续向下按住柱塞，直到完成第 6 步。



6 将注射器（连同相连的药瓶）倒转过来。回拉柱塞，将医嘱要求的氯化钠量吸入注射器中。取下氯化钠瓶并丢弃。现在转到第一支 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 药瓶。

与 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 混合



7 在牢牢地握住一支 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 药瓶的同时，对着药瓶按压 Q-CAP®/注射器，直到穿破药瓶。向下按压柱塞，将所有液体注入药瓶内。



8 在向下按住柱塞的同时，轻轻地旋转，直到溶液澄明。不要摇晃。



每支 BRAVELLE® 和 MENOPUR® 药瓶含有富余药量，因此有小滴液体留在药瓶中是正常的 — 您仍接受了足量的药物*

9 在向下按住柱塞的同时，将注射器与药瓶一起倒转过来。回拉柱塞，将所有液体吸入注射器中。取下药瓶并丢弃。



10 重复最后 3 个步骤处理医嘱要求的所有 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 药瓶。完成后，注射器中的液体量可能略少于开始时的液体量。这是正常现象。

准备注射



11 从装有药液的注射器上扭下 Q-CAP®。



12 扭上带针帽的针头，然后取下针帽。



13 要去除气泡，将针头朝上，轻轻地敲击注射器，直到所有气泡上升至顶部。



14 缓慢地推动柱塞，直到针尖上形成一小滴液滴。

注射药物



15 在左侧或右侧选择注射部位，至少在肚脐下 1 英寸处。（每天使用不同侧。）用酒精棉签清洁注射部位，并晾干。



16 用一只手的两根手指抓住皮肤，并紧紧按住。用另一只手以 90 度角握住注射器的针筒，并快速将针头插入皮肤。按压柱塞，直到注射完所有药物。



17 松开皮肤并轻轻地拔出针头。如果注射部位出血，用纱布垫轻轻按住。如果疼痛，冰敷一小会儿。



18 将注射器丢入针头废弃容器中。丢弃所有开启的药瓶及用过的注射材料，因为这些东西不能再使用。

*每瓶 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 均多装了 10% 的药量，以提供标示的 75 IU 促卵泡激素剂量。如需更详细的说明，请参阅 BRAVELLE® 或 MENOPUR® 的完整处方信息。