



My Vasectomy Doc, LLC consentimiento para el procedimiento de vasectomía (esterilización masculina).

Médico ejecutor: Matthew Delfino, MD, MBA

Procedimiento: El Dr. Delfino realizará una vasectomía sin aguja ni bisturí con anestesia local para lograr el objetivo de la esterilización para que ya no pueda engendrar un embarazo. Yo

\_\_\_\_\_ con fecha de nacimiento \_\_\_\_\_ he tenido tiempo de leer y entender lo siguiente:

- La vasectomía pretende ser una forma permanente de anticoncepción.
- La vasectomía no produce esterilidad inmediata.
- Después de la vasectomía, se requiere otra forma de anticoncepción hasta que el análisis de semen posvasectomía (PVSA, por sus siglas en inglés) confirme el éxito.
- Incluso después de confirmar la oclusión del conducto deferente, la vasectomía no es 100% confiable para prevenir el embarazo.
- El riesgo de embarazo después de la vasectomía es de aproximadamente 1 en 2000 para los hombres que tienen azoospermia posterior a la vasectomía o PVSA que muestran espermatozoides inmóviles raros (RNMS).
- Es necesario repetir la vasectomía en  $\leq 1$  % de las vasectomías, siempre que se haya utilizado una técnica para la oclusión del conducto que se sabe que tiene una tasa baja de fracaso oclusivo.
- Los pacientes deben abstenerse de eyacular durante aproximadamente una semana después de la vasectomía.





- Las opciones para la fertilidad después de la vasectomía incluyen la reversión de la vasectomía y la recuperación de espermatozoides con fertilización in vitro. Estas opciones no siempre tienen éxito y pueden ser costosas.
- Las tasas de complicaciones quirúrgicas como hematoma sintomático e infección son del 1 al 2%. Estas tasas varían según la experiencia del cirujano y los criterios utilizados para diagnosticar estas afecciones.
- Ocasionalmente, será necesario usar una aguja para inyectar anestesia adicional una vez que haya comenzado el procedimiento.
- El dolor escrotal crónico asociado con un impacto negativo en la calidad de vida ocurre después de la vasectomía en alrededor del 1-2% de los hombres. Pocos de estos hombres requieren cirugía adicional.
- Hay disponibles otras alternativas permanentes y no permanentes a la vasectomía.

He tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas y se han abordado todas las inquietudes. Deseo proceder con la vasectomía:

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Witness \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Physician \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

