

QMh Kapitel 06-03 MRE Erhebungsbogen

Unbedingt
Patientenaufkleber aufkleben

Datum:

Hatte der Patient bereits früher eine Besiedelung/Infektion mit: MRSA / MRGN ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRSA bzw. (Rektal-) Abstrich auf MRGN
Ist der Patient chronisch dialysepflichtig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRSA
Ist der Patient pflegebedürftig und hatte er entweder - eine Antibiotikatherapie in den letzten 6 Monaten ? <u>oder</u> - liegende Katheter, Sonden, Kanülen usw. (Devices) ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRSA
Hat der Patient Wunden, Hautläsionen oder wiederkehrende Weichteilinfektionen, Ekzeme, z.B. bei Diabetikern?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRSA <u>und</u> MRGN
Hatte der Patient in den letzten 12 Monaten einen Aufenthalt von > 3 Tagen in einer Einrichtung mit hoher MRSA-Prävalenz im In- oder Ausland? (z.B. Pflegeheim, Reha-Einrichtung, Klinik)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRSA
Hat der Patient regelmäßig Kontakt zu MRSA-Trägern (z.B. als Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder pflegender Angehöriger)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRSA
Hat der Patient beruflich direkten Kontakt zu Tieren in der landwirtschaftlichen Tiermast? (z.B. Tierärzte, Landwirte, Schlachthofpersonal)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRSA
Hatte der Patient in den letzten 12 Monaten (beruflich oder als Patient) Kontakt zum Gesundheitssystem einer Region mit (wahrscheinlich) hoher MRGN-Prävalenz? z.B. Ost-, Südost-, Südeuropa, Naher Osten, Asien, Südamerika, Afrika)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn Ja : Abstrich(e) auf MRGN

- Bitte die Hinweise zum Aufnahmescreening und für die vorstationäre Aufnahme mit beachten.
- **MRSA-Abstrich**: erfolgt gepoolt aus Rachen und Nasenvorhöfen, beidseits. Vorher mit steriler physiolog. Kochsalzlösung anfeuchten.
- **Wunden oder Devices**: hier wird immer eine separate Abstrichprobe entnommen (MRSA; MRGN)
- Bei notwendiger zeitnaher Abklärung: MRSA - PCR-Untersuchung anfordern (immer beide Barcode-Etiketten auf die Probe kleben).
- **MRGN-Screening**: Rektalabstrich - nicht mit MRSA (Nasenabstr.) verwechseln!
- (tiefer) Rektalabstriche: vorsichtig, aber ausreichend tief durch den Analkanal im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt.

Unterschrift