



SUPLEMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRAINDICACIONES

No administrar simultáneamente con vacunas o bacterinas.

GESTACIÓN Y LACTANCIA

Los estudios clínicos de laboratorio en modelos murinos no han demostrado efectos teratogénicos, ni sobre la reproducción de machos y hembras.

REACCIONES ADVERSAS

Ninguna

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

ESPECIES

Perros, gatos, hurones, conejos y aves.

DOSIS

Perros, gatos y hurones: Administrar 1 mL por cada 5 kg de peso corporal.

Aves exóticas: Administrar 0.5 mL en el agua de bebida por ave.

Conejos: Administrar 0.5 mL por cada 2.5 kg de peso corporal.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

No existe.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Su venta requiere receta médica. Consulte al Médico Veterinario. No se administre después de su fecha de caducidad. No se deje al alcance de los niños. No se administre si la tapa del envase ha sido violada. No se administre si el frasco con diluyente no es transparente o si contiene partículas en suspensión o sedimentos.

Facin vet
M-Mascotas

INDICACIONES

Facin Vet® es un extracto proteico, auxiliar en la terapéutica de algunos padecimientos infecciosos, en los que la respuesta inmune tiene gran relevancia, así como en enfermedades con alteraciones inmunológicas y en algunas neoplasias.

COMPOSICIÓN



Preparado a base de aminoácidos **Factran®** (Arginina, lisina, alanina, glicina, valina, serina, prolina, leucina, isoleucina y ácido glutámico)

ALMACENAMIENTO



Mantener el polvo en su envase original, protegido del calor, luz y la humedad a **no más de 30 °C**. Una vez reconstituido el producto **manténgase en refrigeración durante 72 horas**.

PRESENTACIONES



Caja con **6 frascos con liofilizado** y **6 ampolletas con 2ml de diluyente**.



APLICACIÓN ORAL